



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

Versuchsgüter der Pflanzenproduktion

Klostergut Reinshof

Klostergut Marienstein

Klostergut Deppoldshausen



Quelle: Landpixel

2016



Klostergut Reinshof

Klostergut Reinshof

Versuchswirtschaft

für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung
der Georg-August-Universität Göttingen
37083 Göttingen-Reinshof, Tel. 0551/72111

Klostergut Marienstein

Versuchswirtschaft

für Agrarökonomie und Agrartechnik
der Georg-August-Universität Göttingen
37176 Nörten-Hardenberg, Tel. 0551/72111

Leiter der Versuchswirtschaften
Wirtschaftsleiter:

Dr. D. Augustin
M. Müller

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	
	Inhaltsverzeichnis	
	Institutsadressen	
	Aufgabenstellung	
II.	Betriebsbeschreibung	6
	Lageplan	13
III.	Feldversuche und Versuchswesen der Institute der Fakultät für Agrarwissenschaften	14
	Zentrum für Biodiversität und nachhaltige Landnutzung	
	- IMPAC ³ Mischanbau für eine verbesserte nachhaltige Landnutzung in Ackerbau, Grünland und Forst	14
	- IMPAC ³ Pflanzenbau: Wurzelsysteme in Rein- und Mischbeständen von Leguminosen und Nichtleguminosen	16
	- IMPAC ³ Pflanzenzüchtung (Ackerkulturen): Identifizierung von Pflanzenmerkmalen für ackerbauliche Gemenge	17
	- IMPAC ³ Grasland: Welche Eigenschaften von Grünlandpflanzen beeinflussen den Ertrag im Mischanbau?	18
	- IMPAC ³ Forst: Biomassenzuwachs in gemischten Pappel- und Robinienkurzumtriebsplantagen	19
	- IMPAC ³ : Biologie: Reaktion von Boden- organismen auf Mischfruchtanbau und Feedbacks zu Pflanzen	21
	- IMPAC ³ Entomologie	21
	- IMPAC ³ Pflanzenernährung	22
	- IMPAC ³ - Scientific Subproject II.3 Wurzelsysteme in Rein- und Mischbeständen von Leguminosen und Nichtleguminosen	23
	Abteilung Pflanzenbau	
	- Anbau von Energiepflanzen und Index ihrer relativen Anbauwürdigkeit (IrA)	24
	- Bodenbearbeitungsversuch Hohes Feld	26
	- Bodenbearbeitungsversuch Garte-Süd	28
	Abteilung Pflanzenzüchtung	
	- Fachgruppe Genetische Ressourcen und ökologische Züchtung	30
	- Rapszuchtgarten	32
	- Ackerbohnenzuchtgarten	34
	- Züchtungsforschung Mais 2016	37
	Abteilung Pflanzenernährung und Ertragsphysiologie	
	- Langzeitversuch zur P- und K-Düngung auf dem Reinshof	38
	- Einfluss von N-Düngeform und Düngemenge auf die ertragsbezogenen N ₂ O Emissionen bei Winterweizen	41

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz	
- Befallsverlauf, Resistenzausprägung und Mikrosklerotienproduktion an Winter- und Sommerraps im Feld unter hohem Befallsdruck mit <i>Verticillium longisporum</i>	43
- Untersuchungen zu Fruchtfolgen mit Energiepflanzen als ein Beitrag zur Reduktion von phytomedizinischen Risiken und des Pflanzenschutzmitteleinsatzes im Ackerbau	44
- Einfluss der Fruchtfolge auf die Entwicklung von Pilzkrankheiten, Schädlingen und Unkräutern Im Raps	46
- Resistenzbewertung von Rapssorten gegen Erreger der Wurzelhals- und Stängelfäule <i>Phoma lingam</i>	47
- Resistenzbewertung von Hafersorten gegen die Rispenfusariose (<i>Fusarium</i> spp.)	49
Abteilung Agrarökologie	
- Studentisches Praktikum zum Randeffekt auf Pflanzen, Tiere und ökologische Prozesse in an Wald grenzende ökologisch und konventionell bewirtschaftete Weizenfelder	50
Abteilung Graslandwissenschaft	
- Versuchs- und Demonstrationsfläche Agroforst	51
Abteilung Agrarentomologie	
- Wirkung des Befallszeitraums auf Entwicklung und Schadwirkung des Rapserdflohs (<i>Opsylliodes Chrysocephala</i> L.	53
Institut für Zuckerrübenforschung	
- Wertprüfung der Rhizoctoniaresistenz von Zuckerrüben	54
- Sortenversuch zur Rhizoctoniaresistenz von Zuckerrüben	55
Institut für Zoologie und Anthropologie	
- Reaktion von Bodenorganismen auf Mischfruchtanbau und Feedbacks zu Pflanzen	56

Adressen der Forschungseinrichtungen

Forschungsarbeiten und -ergebnisse sowie Veröffentlichungen durch

Department für Nutzpflanzenwissenschaften

- Abteilung Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung,
Von-Siebold-Str. 8, 37075 Göttingen, Tel.: 0551/394352 (Pflanzenbau),
Tel.: 0551/394362 (Pflanzenzüchtung)
- Abteilung Pflanzenernährung und Ertragsphysiologie,
Carl-Sprengel-Weg 1, 37075 Göttingen, Tel.: 0551/395568
- Allgemeine Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz,
Grisebachstr. 6, 37077 Göttingen, Tel.: 0551/3933702
- Abteilung Agrarökologie;
Grisebachstr. 6, 37077 Göttingen, Tel.: 0551/399209
- Abteilung Graslandwissenschaften,
Von-Siebold-Str. 8, 37075 Göttingen, Tel.: 0551/395763
- Abteilung Agrarentomologie,
Grisebachstr. 6, 37077 Göttingen, Tel.: 0551/393730
- Institut für Zuckerrübenforschung,
Holtenser Landstraße 77, 37079 Göttingen, Tel.: 0551/505620

J. F. Blumenbach-Institut für Zoologie und Anthropologie

- Abteilung Tierökologie
Berliner Str. 28, 37073 Göttingen, Tel.: 0551/395445

Burckhardt-Institut

- Abteilung Waldbau und Waldökologie der gemäßigten Zonen,
Büsgenweg 1, 37077 Göttingen, Tel.: 0551/3933672

Büsgen-Institut

- Abteilung Forstgenetik und Forstpflanzenzüchtung
Büsgenweg 2, 37077 Göttingen, Tel. 0551/3933532
- Abteilung Ökopedologie der gemäßigten Zonen
Büsgenweg 2, 37077 Göttingen, Tel. 0551/3933502
- Abteilung Forstbotanik und Baumphysiologie,
Büsgenweg 2, 37077 Göttingen, Tel.: 0551/3933482

Julius Kühn-Institut

- Institut für Pflanzenschutz in Ackerbau und Grünland,
Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, Tel.: 0531/2994501

I Beschreibung und Aufgabenstellung**Versuchsgüter**

Die Versuchsgüter der Universität Göttingen stehen der agrarwissenschaftlichen Fakultät als Experimental-, Lehr-, und Demonstrationsbasis zur Verfügung. Den Schwerpunkt für die Forschung bilden die einzelnen Versuchsanstellungen. Daneben werden auch Datenerhebungen auf Betriebszweigebene für Forschung und Lehre genutzt.

Zusätzlich sind die Versuchsgüter durch Lehrkurse, studentische Übungen und Seminare in den Lehrplan des Fachbereiches Agrarwissenschaften eingebunden.

Klostergut Reinshof

Klostergut Marienstein

Klostergut Deppoldshausen

1. Das in der Leineau südlich von Göttingen gelegene **Klostergut Reinshof** wird seit 1980 als Versuchsgut für Pflanzenbau und -züchtung genutzt. Die Einrichtungen des Versuchsgutes stehen auch den Instituten anderer Fachrichtungen der Fakultät für Versuchsdurchführungen zur Verfügung. Darüber hinaus dient auch das nördlich von Göttingen gelegene **Klostergut Marienstein** mit Flächen in Göttingen, Holtensen und Weende Feldversuche Versuchsanstellungen. Seit dem 1.10.2000 stehen mit dem **Klostergut Deppoldshausen** auch Kalksteinverwitterungsböden als Grenzertragsstandort für verschiedene Fragestellungen zur Verfügung
2. Für die Organisation, Koordinierung und Integration des Versuchswesens ist der Leiter der Versuchswirtschaften (Dr. Augustin) unter Aufsicht der Arbeitsgemeinschaft der Versuchsgüter zuständig. Die wissenschaftliche Leitung obliegt Prof. Dr. Rauber.

Auf einer 1 ha großen Fläche des Klostergutes Reinshof befindet sich die Versuchsstation des Instituts für Pflanzenbau und -züchtung mit Labor, Gewächshaus, Werkstatt, Maschinenhalle und Arbeitsräumen.

3. Die Versuchsgüter verfügen über 700 ha landwirtschaftliche Nutzfläche (LF) mit sehr unterschiedlichen Bodenarten. Etwa 1/3 der Fläche ist für Feldversuche geeignet. Parzellenversuche finden überwiegend auf den homogenen Aulehmen des Reinshofes statt. Der Schwerpunkt der Versuchstätigkeit ist seit Beginn der 80er Jahre auf die Entwicklung umweltschonender Anbausysteme ausgerichtet. Durch langfristig konzipierte Forschungsvorhaben werden praxisorientierte Nutzungssysteme (Extensivierung/integrierte Anbausysteme) entwickelt. Seit 1993 werden diese Untersuchungen durch Forschungsvorhaben des ökologischen Landbaus ergänzt.
Das Feldversuchswesen ist wie folgt strukturiert:

- | | |
|---|-----------|
| • Zuchtgärten (Wechselflächen; 3- bis 6-jährig) | ca. 22 ha |
| • Dauerversuchsflächen konventioneller Anbau | ca. 35 ha |
| • Untersuchungen zum ökologischen Landbau | ca. 10 ha |
| • Versuche in Feldbeständen | ca. 30 ha |
| • Dauerversuchsflächen Agroforst | ca. 8 ha |
| • Demonstrationsflächen | ca. 5 ha |

Beschreibung und Aufgabenstellung

4 Betriebsbeschreibung Reinshof, Marienstein, Deppoldshausen

4.1 Betriebsgröße und Nutzflächen (Wj. 2016)

Nutzung	Fläche in ha			
	Reinshof	Marienstein	Deppoldshausen	Summe
Ackerland	319	254	149,5	722,5
Grünland	3,2	4,7	9,8	17,7
LF	322,2			
Hof	3,1	259,7	159,3	741,2
Wege, Gräben	4,6	1,7	0,4	5,2
Wasser	1,8	1	5,4	11
Holzung	0,5			1,8
Unland	1,9		6,2	6,7
Garten	0,3	1,6	11	14,5
Insgesamt	334,4			0,3
		263	182,3	779,7

Die Betriebsfläche des Reinshofes liegt im Wasserschutzgebiet (Wasserschutzzone III). Der überwiegende Teil gehört zum Landschaftsschutzgebiet „Leinebergland“. Etwa 30 v. H. der LF liegen im Überschwemmungsgebiet von Leine und Garte. Die Betriebsfläche Deppoldshausens liegt je zur Hälfte in den Wasserschutzgebieten II+III. Es werden auf dem Reinshof 31 ha und in Deppoldshausen 75 ha ökologisch bewirtschaftet.

4.2 Natürliche Verhältnisse:

Böden

Reinshof:

etwa 80 % Auenböden (Lehme bis tonige Lehme) aus Schwemmlöß
 etwa 20 % Grieserden aus Löß
 Ackerzahl: 83 BP (50 - 93)

Deppoldshausen:

Kalksteinverwitterungsböden
 Unterer Muschelkalk 20%
 Mittlerer Muschelkalk 70%
 Oberer Muschelkalk 10%
 Ackerzahl: 35 – 62 BP; durchschn. 46 BP

Klima

Reinshof:

Höhenlage über NN 150 m
 Niederschläge langj. Durchschnitt 645 mm (Mai -Juli = 203 mm; Mai-Sept. = 310 mm)
 Rel. wenig Niederschläge recht gleichmäßig verteilt über durchschn. 121 Tage
 mittl. Jahrestemp. langj. Durchschnitt 8,7 °C (Mai-Juli = 15,3 °C; Mai-Sept. = 15,2 °C).

Beschreibung und Aufgabenstellung

Periode zwischen erstem und letztem Frost: 170 Tage
Mittlere relative Luftfeuchtigkeit 77,3 %

Deppoldshausen:

Höhenlage über NN 330 m
mittl. Jahrestemp. langj. Durchschnitt 7,7°C.

4.3 Fruchtfolgen und Anbau im Konventionellen Ackerbau:

Auf besseren Flächen lauten die Fruchtfolgen:

ZR – WW – WW (Senf als Vorfrucht) oder
ZR – WW – WG (Ölrettich als Vorfrucht)

Die Fruchtfolge auf der nichtrübenfähigen Fläche lautet:

WR – WW – WW
WR – WW – WG

Die Fruchtfolge für die Energieproduktion

Mais – WW – WG – ZF-SG
Mais – WW – ZR – WW
Mais – WW – ZF-Grünroggen

Etwa 35 % der Fläche wird jährlich gepflügt. Im Zuckerrübenanbau überwiegt die Mulchsaat. Für den Zwischenfruchtanbau vor Rüben kommt überwiegend Senf oder bei Nematodenvorkommen Ölrettich zu Einsatz. Gedrillt wird Getreide und Raps mit einer gezogenen Scheiben-Grubberkombination (Vaederstad).

4.4 Fruchtfolgen und Anbau im ökologischen Ackerbau:

Ökologischer Ackerbau:

Auf dem Reinshof und in Deppoldshausen wird die gleiche Fruchtfolge angebaut:

Klee gras - WW – Erbsen – WR – SW
oder
Klee gras - WW – Ackerbohnen – WR – SW

Bodenbearbeitung

Stoppel werden einmal tief und 2 - 3 mal flach gegrubbert. Grundsätzlich wird einmal im Jahr gepflügt. Erbsen und WW werden i.d.R. einmal gehackt und je nach Erfordernis und Witterung werden alle Früchte bis zu 3 mal gestriegelt. Auf den sehr tonigen Flächen in Deppoldshausen kann häufig gar nicht gehackt oder gestriegelt werden. Im Ökoanbau wird meist in Kombination mit der Kreiselegge gedrillt. Stickstoff wird ausschließlich über Leguminosen zugeführt.

Beschreibung und Aufgabenstellung

4.5 Anbauverhältnis Reinshof

Fruchtart	1980 ha AF	1989 ha AF	1997 ha AF	2004 ha AF	2012 ha AF	2013 ha AF	2014 ha AF	2015 ha AF	2016 ha AF
W.Weizen	87,1	80,5	86,8	103	30,9	154	122	108	120
S. Weizen	16,5	7,2	2,6	11,5	35	4	12,8	3	11,5
W.Gerste	39,5	40,4	32,0	31,4	22,1	31,5	2,95	42	22,7
Roggen			13,0	6,5	3,1	1,5	0,75	11,5	8,5
Hafer/SoGerste	8,0	1,5	4,9	0	1,5	0,75		1,5	
Sa. Getreide	151,1 64 %	129,6 57 %	139,3 58 %	159,0 64 %	92,6 39 %	192 60 %	139 43%	166 51%	163 51 %
Raps	0	0	15,2	0	0		21,6	0	0
Zuckerrüben	64,6	62,1	44,3	54,3	71	47,5	48,3	49,4	48,9
Mais					50,5	33,6	49,1	65,7	64,1
Ackerbohnen	0	7,8	2,5	2,5			11,5	8,5	8,6
Erbsen			4		0,5	3	3	0	0
Grünroggen					14,1	25		0	0
Kleegras					14,9	16	14,6	7,5	3
Blühmisch./Silphie							6	6	6
Sa. Blattfrucht	64,6 27 %	69,9 30 %	70,2 29 %	59,1 24 %	137 49 %	100 32 %	150,1 47%	131,1 40%	130,6 40 %
Versuchsflächen	20,5 9 %	29,3 13 %	23,2 10 %	28,8 10 %	32,5 12 %	32,3 8 %	34,9 10 %	26,9 9%	30,4 9 %
Davon									
Dauerversuche	11,5	19,5	9,6	19,5	17,4	17,7	20,4	14,7	16,2
Zuchtgärten	9	9,8	8,8	9,8	9,8	9,5	9,5	8,2	9,7
Brachen/sonst	0	0	2,7	0,6	5,1	5,1	5	4	4,5
Sa. Ackerfläche	236	228	239	249	277	324	324	324	324
Versuche in									
Feldbeständen	2	16,0	67,7	45,5	45,5	49,6	44,5	45,6	47,5
a) allgemein	0	16,0	10,0	11,0	11,0	9	4	5	6,9
b) Ökolog. Anbau	0	0	22,7	31,3	32,8	40,6	40,6	40,6	40,6

Beschreibung und Aufgabenstellung

4.6 Erträge

Durchschnittliche Ernteerträge in dt/ha Reinschhof

Fruchtart	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Durchschnitt 10 Jahre
W.Gerste	92,7	73,9	89,2	102,8	93,8	98,12	70,9	92,3	100	110	90,9
W.Weizen	88,5	87,2	92,7	98,9	90,2	85,71	77,6	97,8	97	93,7	92,4
S.Weizen	74,9	73,3					74,6				75
Zuckerrüben	654	586	714	784	740	782	731	743	886	806	742
Zucker	121,	101	130	142,7	132,4	143,8	136	138	159	141	143
Mais (TS/ha)						199	204	173	200	194	194
Grün. TS/ha ¹							6+18,1	4+13			20,5
Raps	40	35,3		53	43,3	47,9	25,3		43,1		38
W.Weizen (ökol.)	58,7	42,4	52,2	52,27	60,71		42,13	46,7	31,8	67,6	49,8
Roggen (ökol.)	37,5	38,6	45,7	50,79	59,94	47,9	46,8		38,47	57,5	45,3
Erbsen (ökol.)	9,6	17,9	33,2		35,58	27,2		10,2		15,2	16,4

¹ Grünroggen + Mais

Durchschnittliche Ernteerträge in dt/ha Marienstein

Fruchtart	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Durchschnitt 10 Jahre
W.Gerste	97,5	76,4	89,3	98,8	96,7	88,4	50,2		92,8	92,5	84,2
W.Weizen	77,6	77,1	87	94,9	86,1	80,4	72,8	91,9	90,7	87,1	80,1
S.Weizen		64	52,8				54,13				59,4
Zuckerrüben	500	513	567	740	700	765	700	634	822	762	680
Zucker	90,9	84,8	102	134	126	142	129	114	146	137	125
Mais			18,5			20,3	19,6	14,9	19	17,7	17,7
Grünroggen + Mais TS/ha				5,6		5,4	6,1	5	14		7,2
				+16,2	17,3	+15,1	+17,2	13	15		16,5
Raps	43,4	33,2	(28)	51,8	41	41,1		44,1	37,2	48,7	40,1

Durchschnittliche Ernteerträge in dt/ha Deppoldshausen

Anbau	Fruchtart	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Durchschnitt 10 Jahre
Konventionell	W.Gerste			75								
	W.Weizen	71,8	59,3	55,1	68,5	65,2	54,4	29,8	87,1	74,7	65,8	63,2
	W.Raps	31,7		25,1	39,2	30,9	17,6	25,3	35	31,8		30,3
Ökologisch	W.Weizen	44,5	28,5	18,6		31,2	32,8		23,7	20		31
	S.Weizen											20,9
	Roggen	23,5	25,9	17,8	28,5	20,1		46,8			37	24,5
	Erbsen	18,1	3,49	33,2	6,16	0	8,1		10,1		12,5	17,6

4.7 Faktorausstattung der Betriebe

Arbeitskräftebesatz

Arbeitswirtschaft	Reinshof	Marienstein	Summe	AK/100ha
Wirtschaftsleiter	0,5	0,5	1	0,15
Buchhaltung und Auswertung	0,25	0,15	0,4	0,06
Schlepperfahrer	2	1,4	3,4	0,51
Schlepperfahrer für Versuchswesen	1	0,5	1,5	0,225
Summe:	3,75	2,65	6,3	0,8

Wichtige Arbeitsgeräte

	Reinshof	Marienstein
Volldrehpflug mit Packer	5 Schar	
Tiefgrubber, Horsch-Tiger	3,0 m	
Grubber Baarck,	4,0 m	
Väderstad, Carrier	5,0 m	
Kreiselegge	4,0 m	
Drillmaschine mit Kreiselegge	4,0 m	3,0 m
Drillmaschine, Vaederstad, Kombi,	3,0 m	
Maisdrillmaschine Vaederstad, 50 cm Reihe	3,0 m	
Anhängespritze, Rau GPS-geführte Teilbreitenschaltung	24,0 m	
Anhängespritze John Deere		24 m
Düngerstreuer 2,7 cbm, teilflächenspezifische Ausbr.	12,0 m	
pneumatischer Düngerstreuer	12,0 m	12 m
Mähdrescher-Selbstfahrer (CLAAS Lexion 420)		4,5 m
Mähdrescher-Selbstfahrer (CLAAS Lexion 430 mit Ertragskart.)	5,4 m	
12-reihiges Rübindrillgerät (Kleine Unicorn)	5,4 m	
Rübenhackmaschine mit Bandspritze	5,4 m	
Getreidehackmaschine	4,0 m	
Getreidestriegel	12,0 m	
6-reihiger Rübenroder (Kleine SF 10) gem. für alle Versuchsgüter		
2 Gülletransportfässer	20 cbm	23 cbm
Gülleausbringfass mit Schleppschlauchverteilung und Schwergrubber zur Direkteinbringung	11 cbm	
Automatisches Lenksystem (5 cm) RTK		
2 Radlader	je 1,8 to Hubkraft, 37 KW	
Getreidetrocknung mit -lager und Saatgutreinigung		
Rundsilos	1300 to	900 to
Flachlager	150 to	300 to
div. Maschinen und Geräte für das Versuchswesen		


Beschreibung und Aufgabenstellung

Zugkräftebesatz

Reinshof/Marienstein				
Zugkräfte	KW	Baujahr	Typ	Zusatzausrüstung
1 Fendt	190	2014	Vario 826	F.hydr.+F.zapfw. Luftdruckregelung
1 Fendt	123	2010	Vario 716	F.hydr.+F.zapfw. Luftdruckregelung
1 Fendt	139	2008	Vario 820	F.hydr.+F.zapfw. Luftdruckregelung
1 Fendt	136	2006	Vario 818	F.hydr.+F.zapfw. Luftdruckregelung
1 Fendt	199	2002	Vario 926	Fronthydraulik
1 Fendt Geräteträger	59	1995	GT 380	F.hydr. + F.zapfw.
KW Summe:	777			
KW/100 ha	128	Schlepper sind durchschnittlich 10 Jahre		

Kostenblöcke der Arbeitserledigung

Reinshof/ Marienstein	€/ha										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Maschinenneuwert	2044	1901	2007	2113	2204	2076	2146	2146	2092	2095	2292
Maschinenzeitwert	566	627	616	731	597	631	526	573	445	587	473
Afa	157	130	136	146	151	131	118	98	94	122	117
Personalaufwand	418	394	410	411	427	407	431	399	420	410	445
Afa + Personal	574	524	546	557	578	538	549	497	514	532	562



1 IMPAC³ Mischanbau für eine verbesserte nachhaltige Landnutzung in Ackerbau, Grünland und Forst (Förderer: BMBF)

Projektleitung: Prof. Dr. J. Isselstein^{1,2}

Koordination: Dr. H.-H. Steinmann¹

¹ Zentrum für Biodiversität und nachhaltige Landnutzung (CBL)

² Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abteilung Graslandwissenschaften (DNPW)

1.1 Zielsetzung

Mischkulturbestände sind in der hochproduktiven Pflanzenerzeugung kaum verbreitet. Zu groß ist die Sorge, dass die Produktionsverfahren zu kompliziert, die Erntezeit oder andere Verfahrensschritte nicht optimal geplant werden können. Hinzu kommt, dass die Züchtung neuer Kulturpflanzensorten sich an Reinbeständen und nicht an Mischungen orientiert. Dabei bieten Mischbestände durchaus Vorteile: Die Ausnutzung der Bodennährstoffe ist aufgrund der vielfältigen sich ergänzenden Wurzelsysteme besser und das Unkraut kann effektiver unterdrückt werden. Weiterhin wird vermutet, dass Mischbestände robuster gegenüber Schädlingen und vorteilhafter für die Vielfalt der Bodenlebewesen sind.

1.2 Fragestellung

Die zentrale Hypothese von IMPAC³ besagt, dass der Erfolg von Mischanbausystemen von bestimmten Eigenschaften der verwendeten Genotypen abhängt und dass eine ideale Kombination der Mischungspartner die Produktivität und Stabilität der Produktionssysteme verbessert.

1.3 Methodisches Vorgehen

Für die drei Landnutzungen Ackerland, Grünland und Gehölzkulturen (Forst) werden unterschiedliche experimentelle Sorten bzw. Klone im Rein- und Mischanbau kultiviert. Acht Genotypen einer Art A werden mit 3 Genotypen einer Art B kombiniert (Tab. 1). Im Versuchsdesign werden die drei Landnutzungen (im Projekt sprechen wir von „Domänen“) jeweils in einem Block zusammengefasst und an zwei Standorten mit je vierfacher Wiederholung angebaut. Die beteiligten Arbeitsgruppen befassen sich mit der pflanzenbaulichen Analyse der verschiedenen Genotypen und ihrer Eigenschaften im Rein- und Mischanbau sowie der Modellierung. Auswertungen über die drei Domänen hinweg sind möglich. Agrarökologische Untersuchungen bewerten die Ökosystemdienstleistungen der Mischanbausysteme. Inwieweit diese Leistungen auch gesellschaftlich und betriebswirtschaftlich in-Wert gesetzt werden können, zeigen sozioökonomische Studien. Kooperationspartner sind die Norddeutsche Pflanzenzucht (NPZ) und die Deutsche Saatveredelung (DSV). Folgende Arbeitsgruppenleiter/innen sind an dem Vorhaben beteiligt:

Fakultät für Agrarwissenschaften

- Prof. Dr. Johannes Isselstein (DNPW, Grasland)
- Prof. Dr. Wolfgang Link (DNPW, Pflanzenzüchtung)
- Prof. Dr. Rolf Rauber (DNPW, Pflanzenbau)
- Prof. Dr. Klaus Dittert (DNPW, Pflanzenernährung)
- Prof. Dr. Stefan Vidal (DNPW, Entomologie)
- Prof. Dr. Anthony Whitbread (DNPW, Modellierung)
- Prof. Dr. Oliver Mußhoff (Department für Agrarökonomie, DARE, Betriebswirtschaft)
- Prof. Dr. Achim Spiller (DARE, Agrarmarketing)

Fakultät für Forstwissenschaften und Waldökologie

- Prof. Dr. Christian Ammer (Burkhardt Institut, Waldbau)
- Prof. Dr. Reiner Finkeldey (Büsgen Institut, Forstgenetik)
- Prof. Dr. Andrea Polle (Büsgen Institut, Forstbotanik)

Fakultät für Biologie und Psychologie

- Prof. Dr. Stefan Scheu (Blumenbach Institut für Zoologie)

Tabelle 1: Die in den „Domänen“ im Rein- und Mischanbau verwendeten Pflanzenarten.

Landnutzungstyp (Domäne)	Art A (8 Genotypen)	Art B (3 Genotypen)
Ackerland	<i>Vicia faba</i>	<i>Triticum aestivum</i>
Grasland	<i>Trifolium repens</i>	<i>Lolium perenne</i> / <i>Cichorium intybus</i>
Forst	<i>Populus</i> Hybriden	<i>Robinia pseudoacacia</i>




Abb. 1: Lageplan am Standort Reinshof. Der Pfeil verweist auf den Eingang und die Leserichtung der Detailpläne.




Abb. 2: Lageplan am Standort Deppoldshausen. Der Pfeil verweist auf den Eingang und die Leserichtung der Detailpläne.

2 IMPAC³ Pflanzenbau: Wurzelsysteme in Rein- und Mischbeständen von Leguminosen und Nichtleguminosen

M. Sc. J. Streit, Dr. C. Meinen, Prof. Dr. R. Rauber
Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abteilung Pflanzenbau

2.1 Zielsetzung

Das Wurzelwachstum und die Wurzelverteilung von genetisch verschiedenen Komponenten im Mischanbau (Gemenge) sind weitgehend unerforscht. Es ist bekannt, dass unterirdische Interaktionen, z.B. im Bereich der Nährstoffe, zu einem erhöhten Ertrag im Gemenge, verglichen mit den Reinsaat, führen können.

Das zentrale Anliegen des Teilprojektes ist, die vielfältigen Prozesse in Gemengen im unterirdischen Bereich besser zu verstehen. In einer Kausal-Analyse soll versucht werden, erhobene Daten über Wurzelmasse und -verteilung in Verbindung mit oberirdischen Parametern wie Blattflächenindex, Wasserverbrauch und Ertrag zu bringen. Dieses Teilprojekt beschäftigt sich mit allen drei Domänen (Acker, Grünland, Forst). Ziel des Teilprojektes ist die Erfassung der vertikalen Wurzelmassenverteilung von Leguminosen und Nichtleguminosen in Reinsaat und im Gemenge. Der jeweilige Prozentanteil der Arten an der Wurzelgesamtmasse wird erhoben.

2.2 Fragestellung

- Unterscheiden sich die Wurzelmassen von Leguminosen und Nichtleguminosen in Rein- und Mischanbau?
- Nutzen Leguminosen und Nichtleguminosen dieselben Wurzelhorizonte?

2.3 Methodisches Vorgehen

Für jede Domäne (Ackerland, Grünland und Forst) gibt es eine im Mittelpunkt der Untersuchungen stehende Art A: Ackerbohne, Weißklee und Pappel. Die dazugehörigen Begleitarten B der jeweiligen Domäne sind Weizen, Weidelgras und Robinie. Acht Genotypen der Art A werden mit drei Genotypen der Art B kombiniert. Die Rein- und Mischbestände dieser Leguminosen und Nichtleguminosen werden einmal pro Jahr beprobt. In jeder Domäne werden alle vier Wiederholungen untersucht. Dafür werden pro Plot mindestens zwei Beprobungen bis zu einer Tiefe von 60 cm vorgenommen. Die Beprobung wird mittels einer Rammkern-sonde durchgeführt. Die enthaltenen Wurzeln werden anschließend ausgewaschen. Mit Hilfe eines Scanners wird die Länge der Wurzeln bestimmt. Danach werden die Wurzeln getrocknet und die unterirdische Biomasse erfasst. In diesem Teilprojekt sollen die Wurzeln von Leguminosen und Nichtleguminosen in den Gemengen mit Hilfe der Fourier-Transform-Infrarot-Spektroskopie (FTIR) untersucht werden. Da eine morphologische Identifikation krautiger Arten nicht möglich ist und andere Bestimmungsmethoden zu aufwendig sind, bietet diese Art der Spektroskopie die Möglichkeit, Wurzeln verschiedener Arten schnell und einfach zu identifizieren. Mit diesem Verfahren werden die Wurzelproben der Gemenge auf ihre Artzusammensetzung hin analysiert.!

3 IMPAC³ Pflanzenzüchtung (Ackerkulturen): Identifizierung von Pflanzenmerkmalen für ackerbauliche Gemenge.

D. Siebrecht, R. Martsch, Prof. Dr. W. Link, Prof. Dr. R. Rauber.
 Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abteilungen Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung

3.1 Fragestellung: Wie züchtet man Sorten, die zum höchsten Gemengeertrag führen?

- Führt eine züchterische Auslese zwischen Ackerbohnen – basierend auf Reinbeständen – zum selben Ergebnis wie eine Auslese basierend auf entsprechenden Gemengen (Ackerbohne – Weizen)? Und hängt dieses von der Wahl des konkreten Gemengepartners (Weizen) ab?
- (Wie) kann man mit pflanzenzüchterischen Werkzeug die Eigenschaften der Kandidaten erkennen und für die Auslese nutzen, die beim Gemengeanbau der Kandidaten zu einem überlegenen Gemengeertrag führen?

Dieses Subproject steuert zum Gesamtprojekt IMPAC³ die Pflanzenzüchterische und Pflanzenbauliche Expertise („Acker“) bei. Der benutzte Winterweizen stammt von der GSL (incl. NPZ), es sind zugelassene Sorten. Die Winterackerbohnen stammen aus der Forschungskoooperation von W. Link mit O. Sass (NPZ), das Saatgut wird in Göttingen erzeugt und vorgehalten. Die Gruppe Link/Rauber verantwortet die jährliche Anlage und Pflege des zentralen ‘Acker’-Experiments an beiden Standorten. Die Gruppe Rauber definiert die agronomischen Parameter des ‚Acker‘-Experimentes und verfolgt die Analyse der Phänomene über die Domänen hinweg.

'Acker', Pflingstanger Block 1 2016																					
←-----> 34,5m																					
A1	A1/B1	A1/B2	A1/B3	B1	B2	A5/B1	A5/B3	A5/B2	A5												
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40												
A2	A2/B1	A2/B2	A2/B3	B1	B2	A6/B1	A6/B3	A6/B2	A6												
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30												
A3	A3/B2	A3/B1	A3/B3	B1	B3	A7/B3	A7/B1	A7/B2	A7												
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
A4	A4/B3	A4/B2	A4/B1	B1	B3	A8/B2	A8/B3	A8/B1	A8												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

45,0m

A1 bis A8: Winter-Ackerbohnen; B=Winterweizen (B1=Genius, B2=Boxer, B3=Hybery)

Die Abbildung zeigt den ersten Block der Domäne ‚Acker‘ am Standort Pflingstanger (Reinshof). Die laufenden Plots 1-10 enthalten den ersten und zweiten Main-Plot der als Spaltanlage randomisierten Bohnen- und Bohnengemenge Plots („augmented“ um die Reinsaat mit B1-B3).
 Art **A**: Winterackerbohne (Reinsaat 40 K./m²); Art **B**: Winterweizen (Reinsaat 320 K./m²). Gemenge als ‚reihenweise‘ Reinsaat, 20 K./m² Ackerbohnen, 160 K./m² Weizen.

4 IMPAC³ Grasland: Welche Eigenschaften von Grünlandpflanzen beeinflussen den Ertrag im Mischanbau?

M. Sc. S. Heshmati, Prof. Dr. J. Isselstein

Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abteilung Graslandwissenschaft

4.1 Zielsetzung

Der Anbau von Artenmischungen im Grasland hat in Mitteleuropa eine lange Tradition. Insbesondere Gemenge von Futtergräsern und Leguminosen sind wissenschaftlich gut untersucht und in der Praxis gebräuchlich. Ertragliche Vorteile solcher Gemenge können vorrangig auf die symbiotische N-Fixierung der Leguminosen zurückgeführt werden. Die Rolle anderer physiologischer oder auch morphologischer Eigenschaften der Partner ist dagegen bisher weitaus weniger bekannt. Spezifische Kenntnisse könnten dazu genutzt werden, die Mischungseignung von Graslandarten gezielt durch Züchtung zu verbessern. Ziel dieses Teilprojektes ist es, die Rolle der genetischen Variabilität von Wuchseigenschaften bei Weißklee im Hinblick auf die agronomische Leistung von Mischbeständen zu analysieren.

4.2 Methodisches Vorgehen

Acht Weißklee-Genotypen (WC 1 bis 8) der Deutschen Saatveredelung DSV AG werden an den Versuchsstandorten sowie der Versuchstation Asendorf der DSV im Reinbestand sowie in Mischung mit Deutschem Weidelgras, mit Futter-Zichorie und mit einem Gemisch aus Deutschem Weidelgras und Futter-Zichorie angebaut. Die Leistung des Weißkleees im Gemengeanbau kann somit differenziert nach Gemengepartner beurteilt werden. Folgende Merkmale werden erhoben: Ertragsbildung und Futterertrag, Futterqualität, Grasnarbenstruktur, Pflanzen- bzw. Triebdichte, Blattflächenindex, Strahlungsabsorption, Mikroklima, Blattmerkmale.

Abb.1: Plan von Block 1 (Parzellengröße 3x5 m). A1....A8: Reinsaaten Weißklee Genotypen 1...8. B1_N0: Reinsaat Deutsches Weidelgras ohne N-Düngung. B1_N1: Reinsaat Deutsches Weidelgras mit N-Düngung (240 kg/ha u. Jahr). B2_N0 und B2_N1: Reinsaaten Zichorie. B3_N0 und B3_N1: Deutsches Weidelgras + Zichorie. A/B: Gemengsaaten.

WC1				
A1	A1/B1	A1/B2	A1/B3	B1_N0
	101	102	103	104
				105
WC3				
A3	A3/B1	A3/B2	A3/B3	B3_N0
	111	112	113	114
				115
WC5				
A5	A5/B1	A5/B2	A5/B3	B1_N1
	121	122	123	124
				125
WC7				
A7	A7/B1	A7/B2	A7/B3	B3_N1
	131	132	133	134
				135

WC2				
A2	A2/B1	A2/B2	A2/B3	B2_N0
	106	107	108	109
				110
WC4				
A4	A4/B1	A4/B2	A4/B3	B1_N0
	116	117	118	119
				120
WC6				
A6	A6/B1	A6/B2	A6/B3	B2_N1
	126	127	128	129
				130
WC8				
A8	A8/B1	A8/B2	A8/B3	B1_N1
	136	137	138	139
				140

5 IMPAC³ Forst: Biomassenzuwachs in gemischten Pappel- und Robinienkurzumtriebsplantagen

J. Rebola Lichtenberg, Prof. Dr. C. Ammer, * (Waldbau)
J. Ropertz, Prof. Dr. R. Finkeldey, ** (Forstgenetik)
Dr. D. Euring, Prof. Dr. A. Polle, ** (Forstbotanik)
Georg-August-Universität Göttingen
* Burkhardt-Institut; ** Büsgen-Institut
Büsgenweg 1, 37077 Göttingen

5.1 Zielsetzung

Pappelhybride sind schnellwüchsig und werden in der Produktion von Holzbiomasse bevorzugt in Monokulturen angebaut. Die Robinie ist in der Biomassenproduktion eine weniger bekannte Baumart, die aber für die Produktion von Bioenergie oder Zellstoff vielversprechende Eigenschaften vorweist. Robinien weisen eine erhöhte Toleranz gegen Trockenstress und haben die Fähigkeit Stickstoff zu binden. Diese letzte Eigenschaft der Robinie kann für die Pappel innerhalb einer Mischkultur ein Vorteil darstellen indem eine interne Selbstregulierung des Anbausystems begünstigt und infolgedessen das Potenzial aufweist den Biomassenzuwachs zu erhöhen

5.2 Fragestellungen

Gibt es einen positiven Effekt von der Robinie auf den Biomassenzuwachs bestimmter Pappelklone und auf welchen Ebenen lässt sich dies bestimmen?

5.3 Methodische Vorgehensweisen

Die Versuchsflächen befinden sich auf zwei Standorten, die jeweils in vier Blocks eingeteilt sind. Jeder Block ist in 40 Kleinparzellen eingeteilt, die die 8 Pappelklone und 3 Robiniensorten in verschiedenen Mono- und Mischkulturen sortiert. Jede Kleinparzelle misst 5 x 5 m und enthält 25 Bäume (Abb. 1).

Abteilung Waldbau und Waldökologie der gemäßigten Zonen

- Wiederholte Messungen des Baumstammes und Baumhöhen und Ernte zur Schätzung des Biomassenzuwachs und Biomassenvorrats einer Kultur anhand von allometrischen Funktionen.
- Analyse der Kronenstruktur, Platzaufteilung und Blattflächenindex als Indikatoren für Baumkonkurrenz.

Abteilung Forstbotanik und Baumphysiologie

- Bestimmung des Stickstoffs- und Wassernutzungseffizienz bei wiederholter Ernte von Blättern, Holz und Rinde
- Charakterisierung der Holzeigenschaften
- RNA Sequenzierung in Wurzel und Holzmaterial sowie und die funktionelle Charakterisierung von Kandidatengenen für die Entwicklung von molekularen Markern

Abteilung Forstgenetik und Forstpflanzenzüchtung

- Mit Hilfe der Transkriptomanalyse soll die Aktivität und Expression bestimmter Gene unter bestimmten Umständen gemessen werden.
- Weiterhin werden morphologische und phänotypische Eigenschaften untersucht (z.B. Knospenentwicklung und Knospenentfaltung), und auf molekularer Ebene wird mit Hilfe von genetischen Markern und SNPs („Single Nucleotide Polymorphisms“) die genetische Vielfalt untersucht. Die Transkriptom Analyse wird auf Basis des „Next Generation Sequencing“ (NGS) durchgeführt.

Abbildung 1 zeigt einen beispielhaften Randomisierungsplan eines Blockes.

Abb. 1: Block 2 am Standort Reinshof bzw. Block 2 Standort Deppoldshausen (P1 bis P8 = Pappelklone; R1, R2, R3 = Robinienarten).

		Plot (Nr.)				
Main Plot	P1 36	P1R1 37	P1R2 38	P1R3 39	R1 40	
	R1 31	P2R3 32	P2 33	P2R1 34	P2R2 35	
	P3R2 26	P3R1 27	R1 28	P3R3 29	P3 30	
	P4 21	R1 22	P4R3 23	P4R1 24	P4R2 25	
	P5R3 16	P5R2 17	P5 18	P5R1 19	R2 20	
	R2 11	P6R1 12	P6R2 13	P6R3 14	P6 15	
	P7 6	R3 7	P7R3 8	P7R1 9	P7R2 10	
	P8R3 1	P8R1 2	P8 3	P8R2 4	R3 5	

Pflanzen pro Kleinparzelle am Beispiel einer Mischungsvariante:

P Pappel
R Robinie

P	R	P	R	P
R	P	R	P	R
P	R	P	R	P
R	P	R	P	R
P	R	P	R	P

6 IMPAC³: Biologie: Reaktion von Bodenorganismen auf Mischfruchtanbau und Feedbacks zu Pflanzen

P. Götsch, Prof. Dr. S. Scheu

J.F.-Blumenbach - Institut für Zoologie und Anthropologie, Abteilung Tierökologie

Bodenorganismen einschließlich Mikroflora und Bodenfauna, bilden einen wesentlichen Bestandteil der Biodiversität in Agrarökosystemen. Insbesondere in der Rhizosphäre von Pflanzen reagieren sie empfindlich auf die Identität und Vielfalt der Pflanzen. Dabei modifizieren Pflanzen sowohl die Struktur als auch die Funktionsweise der Bodengemeinschaften mit potenziell wichtigen Rückkoppelungseffekten, für die Leistungsfähigkeit, Biomasseproduktion und den Ernteertrag der Pflanzen.

Es wird zunehmend anerkannt, dass Bodenorganismen in der Rhizosphäre von Pflanzen nicht nur Auswirkungen auf das Pflanzenwachstum haben, sondern auch die Anfälligkeit der Pflanzen für Krankheitserreger und Pflanzenfresser beeinflussen.

Im Rahmen des IMPAC³-Projektes untersuchen wir die Reaktion von Bodenorganismen auf Unterschiede in der Pflanzenzusammensetzung, sowohl verschiedener Genotypen, Mischungen verschiedener Genotypen, als auch Mischungen mit anderen Pflanzenarten der Acker, Grasland und Waldsysteme. Ferner wird die Reaktion verschiedener Pflanzen-Genotypen und Genotyp Mischungen mit anderen Pflanzenspezies untersucht, um Variationen in der Reaktion von Bodenorganismen der Rhizosphäre zu erkunden.

Die Struktur der mikrobiellen Gemeinschaften im Boden soll mittels substratinduzierter Atmung und Phospholipid-Fettsäure-Analyse untersucht werden und die der Bodentiergemeinschaften mittels Hitzeabstrahlung. Bestimmte Mikroorganismen und Bodentiere, die signifikant auf Veränderungen der Pflanzen Genotypen und Mischungen von Pflanzen Genotypen mit anderen Pflanzenarten reagieren, werden zur Beurteilung von Bodenrückkoppelungseffekten auf die Leistungsfähigkeit der Pflanzen untersucht.

7 IMPAC³ Entomologie)

S. Granzow, Prof. Dr. S. Vidal

Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abteilung Entomologie

7.1 Einleitung:

Mikroorganismen, wie Bakterien, Pilze und Archeen, haben einen wichtigen Anteil in grundlegenden Prozessen, unter anderem, dem Nährstoffkreislauf, in der Kohlenstoffbindung und dementsprechend im Ökosystem (Singh et al. 2004, Hallin et al. 2009). In der Agrarindustrie sind endophytische und rhizosphärische Mikroorganismen von zentraler Bedeutung aufgrund ihres Potentials die Nährstoffaufnahme, die Gesundheit und das Wachstum einer Pflanze zu beeinflussen (Sturz und Nowak 2000, Phillippot et al. 2013). In den letzten Jahren zeigten einige Studien, dass die Anbaumethode, wie der Mischbau, Bakterien Gemeinschaften in der Rhizosphäre beeinflussen konnten (Qiao et al. 2012, Zhang et al. 2015). Jedoch war der Fokus dieser Studien hauptsächlich auf den rhizosphärischen Mikroorganismen (Song et al. 2007A, Qiao et al. 2012) und vor allem auf besonderen Gruppen, wie den Ammonium-oxidierenden Bakterien (Sun et al. 2009, Zhang et al. 2015). Studien, die sich mit Pilz und Bakterien Gemeinschaften in den unterschiedlichen Kompartimenten der Pflanze hinsichtlich des Mischbaus befassen sind jedoch immer noch fehlend.

7.2. Zielsetzung

Das Ziel der Studie war den Einfluss des Mischanbaus auf die Diversität und Struktur von Mikroorganismen Gemeinschaften in verschiedenen Habitaten einschließlich dem Boden, der Rhizosphäre und der Endosphäre von *Vicia faba* L. und *Triticum aestivum* L. zu erforschen.

7.3 Methodisches Vorgehen

Hierfür wurde ein Gewächshaus-Experiment mit der Ackerbohne und dem Weichweizen durchgeführt, die in Misch- und Monokultur angesät wurden. In Mischkultur wuchsen die Pflanzen in Reihe oder randomisiert. Nachdem diese ca. 4 Wochen alt waren wurden die Proben entnommen. Zufällig ausgewählte Pflanzen von je Weizen und Bohne, wurden Oberflächen sterilisiert. Die mikrobielle Gemeinschaft wurde mit Hilfe der Illumina (MiSeq) Sequenzierung analysiert und dabei waren das Ziel die 16S rDNA der Bakterien und Archeen und die ITS (internal transcribed spacer) Region der Pilze.

8 IMPAC³: Pflanzenernährung

A. Lingner, Prof. Dr. K. Dittert
Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abteilung Pflanzenernährung

Aktuelle Klimastudien prognostizieren für Deutschland und große Teile Westeuropas häufigere und intensivere Trockenperioden im Spätfrühjahr/Sommer. Um pflanzenbauliche Anpassungsstrategien zu entwickeln, ist es notwendig zu verstehen, welche Pflanzenmerkmale für hohe Leistungen im komplexen Gemengeanbau verantwortlich sind, denn Stress durch Wassermangel begrenzt die Funktion und Leistung von Nutzpflanzen mehr als jeder andere Umweltfaktor. Vor diesem Hintergrund ist eine frühzeitige visuelle Erkennung der zeitlichen und räumlichen Variation von Trockenstress und dem Effekt auf Pflanzenwachstum und Ertragsbildung für das landwirtschaftliche Monitoring und Management sehr wichtig. Eine solche visuelle Erkennung von Trockenstress und Nährstoffmangel wurde bereits erfolgreich mit Thermobildern und der Anwendung des Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) in Fernerkundung erreicht. In diesem Projekt wird daher ein ferngesteuertes Fluggerät (UAV) verwendet, das mit einer Thermo- und einer NDVI-Kamera ausgestattet ist. Dies ermöglicht es, Transpirationsraten, Stickstoffaufnahme, Gesundheitsstatus und Blattflächenindex des Bestandes zu beobachten. Diese Fernerkundungstechniken werden dazu verwendet, in Reinsaat- und Gemenge-Beständen Stress durch Umweltfaktoren zu bestimmen und Ertragsvorhersagen zu treffen.

9 IMPAC³ - Scientific Subproject II.3 – Wurzelsysteme in Rein- und Mischbeständen von Leguminosen und Nichtleguminosen

M. Sc. J. Streit, Dr. C. Meinen, Prof. Dr. R. Rauber
Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abteilung Pflanzenbau

9.1 Zielsetzung

Das Wurzelwachstum und die Wurzelverteilung von genetisch verschiedenen Komponenten im Mischanbau (Gemenge) sind weitgehend unerforscht. Es ist bekannt, dass unterirdische Interaktionen, z.B. im Bereich der Nährstoffe, zu einem erhöhten Ertrag im Gemenge, verglichen mit den Reinsaat, führen können.

Das zentrale Anliegen des Teilprojektes ist, die vielfältigen Prozesse in Gemengen im unterirdischen Bereich besser zu verstehen. In einer Kausal-Analyse soll versucht werden, erhobene Daten über Wurzelmasse und -verteilung in Verbindung mit oberirdischen Parametern wie Blattflächenindex, Wasserverbrauch und Ertrag zu bringen. Dieses Teilprojekt beschäftigt sich mit allen drei Domänen (Acker, Grünland, Forst). Ziel des Teilprojektes ist die Erfassung der vertikalen Wurzelmassenverteilung von Leguminosen und Nichtleguminosen in Reinsaat und im Gemenge. Der jeweilige Prozentanteil der Arten an der Wurzelgesamtmasse wird erhoben.

9.2 Fragestellung

- Unterscheiden sich die Wurzelmassen von Leguminosen und Nichtleguminosen in Rein- und Mischanbau?
- Nutzen Leguminosen und Nichtleguminosen dieselben Wurzelhorizonte?

9.3 Methodisches Vorgehen

Für jede Domäne (Ackerland, Grünland und Forst) gibt es eine im Mittelpunkt der Untersuchungen stehende Art A: Ackerbohne, Weißklee und Pappel. Die dazugehörigen Begleitarten B der jeweiligen Domäne sind Weizen, Weidelgras und Robinie. Acht Genotypen der Art A werden mit drei Genotypen der Art B kombiniert. Die Rein- und Mischbestände dieser Leguminosen und Nichtleguminosen werden einmal pro Jahr beprobt. In jeder Domäne werden alle vier Wiederholungen untersucht. Dafür werden pro Plot mindestens zwei Beprobungen bis zu einer Tiefe von 60 cm vorgenommen. Die Beprobung wird mittels einer Rammkernsonde durchgeführt. Die enthaltenen Wurzeln werden anschließend ausgewaschen. Mit Hilfe eines Scanners wird die Länge der Wurzeln bestimmt. Danach werden die Wurzeln getrocknet und die unterirdische Biomasse erfasst. In diesem Teilprojekt sollen die Wurzeln von Leguminosen und Nichtleguminosen in den Gemengen mit Hilfe der Fourier-Transform-Infrarot-Spektroskopie (FTIR) untersucht werden. Da eine morphologische Identifikation krautiger Arten nicht möglich ist und andere Bestimmungsmethoden zu aufwendig sind, bietet diese Art der Spektroskopie die Möglichkeit, Wurzeln verschiedener Arten schnell und einfach zu identifizieren. Mit diesem Verfahren werden die Wurzelproben der Gemenge auf ihre Artzusammensetzung hin analysiert.

Förderung: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Laufzeit der ersten Phase: 1. Februar 2015 bis 31. Januar 2018.

10 Anbau von Energiepflanzen und Index ihrer relativen Anbauwürdigkeit (IrA)

M. Sc. K. Hey, Prof. Dr. R. Rauber

Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abteilung Pflanzenbau

10.1 Zielsetzung

Das Ziel des Versuches ist es, spurenelementakkumulierende Energiepflanzenarten für Biogasanlagen hinsichtlich ihrer Eignung für den Praxisbetrieb zu testen. Spurenelemente, v.a. Kobalt und Nickel, sind im Biogasbildungsprozess für eine optimale Methanausbeute durch die Mikroorganismen essenziell. Mais hat ein geringes Aufnahmevermögen für diese prozessrelevanten Spurenelemente mit der Folge, dass es bei alleinigem Maisinput in Biogasanlagen zu einem Spurenelementmangel kommt. Um diesem Mangel zu begegnen, werden in der Praxis industrielle Spurenelementadditive zugegeben. Diese Additive verursachen Kosten und bergen Risiken sowohl für den Anwender als auch die Umwelt. Alternative Energiepflanzen akkumulieren im Vergleich zu Mais erheblich mehr Spurenelemente. Die Hypothese ist, dass durch die Zumischung von Energiepflanzen, die Spurenelemente akkumulieren, eine ausreichende Versorgung für die Vergärung gewährleistet ist. Die Anbauwürdigkeit dieser Energiepflanzen wird durch den Bewertungsindex IrA (Menke 2011) abgebildet. Als Teilindizes sollen neben dem Spurenelementgehalt der Sprossmasse verschiedene acker- und pflanzenbaulich bedeutsame Aspekte in den erweiterten IrA Eingang finden: Der Feldaufgang und die Bodenbedeckung dienen der Bewertung des Erosionsschutzes und der Unkrautunterdrückung. Die Nmin-Menge im Boden nach der Ernte bzw. im Winter soll Aufschluss über die Nitratauswaschungsgefahr beim Anbau dieser Feldfrüchte liefern. Trockenmasse- und Methanertrag sind wichtige Kenngrößen und bestimmen die Leistungsfähigkeit der verschiedenen Feldfrüchte. Der Trockenmasseertrag der Wurzeln ist ein Indikator für die Humusreproduktion beim Anbau von Energiepflanzen. Der Trockensubstanzgehalt bestimmt maßgeblich die Silierfähigkeit der Biomasse. Der Wassergehalt des Bodens nach der Ernte zeigt, welchen Wasserzustand eine Feldfrucht nach der Ernte zurücklässt. Der Trockenmasseertrag von Mais nach Winterungen kennzeichnet ihre Vorfruchtwirkungen. Daneben fließen auch ökonomische und soziale Aspekte in IrA ein.

10.2 Methodische Vorgehensweise

In 2-jährigen Feldversuchen (2014/15 und 2015/16) werden in Göttingen (Löss) und Verliehausen (sandiger Schluff) spurenelementreiche Feldfrüchte und im Kontrast dazu klassische Energiepflanzenarten (Mais, Wintertriticale) angebaut. Die Feldversuche sind in Göttingen am Standort Reinshof, Schlag Garte-Nord angelegt. Die Vorfrucht ist Winterweizen. Nach einer reduzierten Bodenbearbeitung wurden im Herbst 2015 die Winterungen Wickroggen, Winterackerbohnen, Wintertriticale und ein Gemenge aus Winterackerbohnen und Wintertriticale ausgesät. Nach Schwarzbrache über Winter folgen im Frühjahr 2016 innerhalb der Sommerungen Sommerackerbohnen, Einjährige Blütmischung, Amarant, Mais und ein Gemenge aus Amarant und Mais. Seit Herbst 2014 bzw. Frühjahr 2015 sind Deutsches Weidelgras, Durchwachsene Silphie und Mehrjährige Blütmischung als mehrjährige Arten angebaut. Nach den Winterungen folgt Mais als Zweitfrucht. Die Feldversuche sollen dem konventionellen Landbau entsprechen und mit praxisüblichem Aufwand an Düngemitteln (einschließlich Gärrest) und Pflanzenschutz durchgeführt werden. Geerntet werden die Pflanzen zum Zeitpunkt der maximalen Biomasseproduktion bzw. praxisüblich.

Förderung: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (Projektträger des BMEL).

Gesamtlaufzeit des Projekts: Anfang 2015 bis Ende 2017

11 Bodencbearbeitungsversuch Hohes Feld

Prof. Dr. R. Rauber
Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abteilung Pflanzenbau

11.1 Zielsetzung


In der pflanzlichen Erzeugung wird Energie aus fossilen Energieträgern und Arbeitszeit für die Durchführung von Bodencbearbeitungsmaßnahmen wie Pflügen, Rückverfestigen, Stoppelbearbeitung und Saatbettbearbeitung verbraucht. Bei intensiver Feldwirtschaft kann die "*Lockerbodenwirtschaft*" mit Wendepflug trotz Lockerung einer Bodenverdichtung und Bodenerosion Vorschub leisten. Im pfluglosen Ackerbau wird auf die tief-wendende Pflugarbeit verzichtet. Stoppelbearbeitung und Saatbettbereitung werden mit zapfwellenbetriebenen, mischenden Geräten (Zinkenrotor, Kreiselegge) durchgeführt. Die Bearbeitungstiefe soll hierbei möglichst nicht mehr als 8 cm betragen. Bei dieser "*Festbodenmulchwirtschaft*" erfolgt die Aussaat mit einer Scheibenschardrillmaschine. Ziel des Versuchs ist der Vergleich der beiden Bodencbearbeitungssysteme "*Lockerbodenwirtschaft*" und "*Festbodenmulchwirtschaft*" über einen langen Zeitraum im Hinblick auf die Bodenfeuchte, die Dynamik der organischen Substanz, die Entwicklung des Bodengefüges, die biologischen und chemischen Eigenschaften des Bodens, die Wurzelverteilung, die Verunkrautung, die Ertragsbildung der Feldfrüchte und die Qualität der pflanzlichen Erzeugnisse sowie das Strohmanagement und den Abbau der Erntereste.

11.2 Methodische Vorgehensweisen

Anlage des Versuches im Herbst 1967 als dreifaktorielle Streifenanlage auf Löss-Kolluvium durch Prof. Kord Baeumer. Geprüft wurden in den Jahren 1968 bis 1986 die Faktoren Bodencbearbeitung ("*Lockerbodenwirtschaft*" und der gänzlich bearbeitungsfreie Ackerbau, die konsequenteste Form der "*Festbodenmulchwirtschaft*", engl. Zero-tillage), N-Düngung und Fruchtfolge. Seit 1987 nur noch Faktor Bodencbearbeitung bei mittlerer N-Düngung und betriebsüblicher Fruchtfolge; dabei 1993: Winterraps, 1994: Winterweizen, 1995: Sommergerste, 1996: Winterweizen, 1997: Wintergerste. Danach Umstellung auf *Festbodenmulchwirtschaft* mit flach-mulchender Bearbeitung im Vergleich zur konventionellen *Lockerbodenwirtschaft*. 1998: Hafer, 1999: Körnererbse, 2000: Wintergerste, 2001: Winterraps, 2002: Winterweizen, 2003: Winterweizen, 2004: Körnererbse, 2005: Winterweizen, 2006: Mais („Gavott“), 2007: Ackerbohnen („Fuego“), 2008: Winterweizen („Hermann“), 2009: Sommergerste („Marthe“), 2010: Winterroggen („Visello“), 2011: Hafer („Scorpion“), 2012: Sommergerste (Gemenge aus „Marthe“ und „Grace“, ungebeizt), 2013: Winterraps („Visby“), 2014: Sommertriticale („Somtri“) mit nachfolgender Zwischenfrucht: Gemenge aus Buchweizen, Sonnenblumen, Phacelia und Alexandriner-Klee), 2015: Ackerbohnen („Fuego“), 2016: Winterweizen („Matrix“).

11.3 Wissenschaftliche Bedeutung

Ältester noch existierender Versuch in Deutschland zum Ackerbau mit reduzierter Bodencbearbeitung. An diesem Versuch wurden Fragen der Stickstoffernährung der Pflanzen und des Stickstoffumsatzes im Boden geprüft. Über die lange Versuchszeit wurde die Anreicherung von Kohlenstoff, Kalium und Phosphor in oberflächennahen Bodenschichten untersucht und die Änderung der Bodenstruktur verfolgt. Solange wie möglich soll dieser Dauerversuch als wissenschaftliches Forschungsobjekt erhalten werden.



Feldplan "Hohes Feld"

12 Bodenbearbeitungsversuch Garte-Süd

Prof. Dr. R. Rauber

Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abteilung Pflanzenbau

12.1 Zielsetzung

In der pflanzlichen Erzeugung wird Energie aus fossilen Energieträgern und Arbeitszeit für die Durchführung von Bodenbearbeitungsmaßnahmen wie Pflügen, Rückverfestigen, Stoppelbearbeitung und Saatbettbearbeitung verbraucht. Bei intensiver Feldwirtschaft kann die "*Lockerbodenwirtschaft*" mit Wendepflug trotz Lockerung einer Bodenverdichtung und Bodenerosion Vorschub leisten. Im pfluglosen Ackerbau wird auf die tief-wendende Pflugarbeit verzichtet. Stoppelbearbeitung und Saatbettbereitung werden mit zapfwellenbetriebenen, mischenden Geräten (Zinkenrotor, Kreiselegge) durchgeführt. Die Bearbeitungstiefe soll hierbei möglichst nicht mehr als 8 cm betragen. Bei dieser "*Festbodenmulchwirtschaft*" erfolgt die Aussaat mit einer Scheibenschardrillmaschine. Ziel des Versuchs ist der Vergleich der beiden Bodenbearbeitungssysteme "*Lockerbodenwirtschaft*" und "*Festbodenmulchwirtschaft*" über einen langen Zeitraum im Hinblick auf die Bodenfeuchte, die Dynamik der organischen Substanz, die Entwicklung des Bodengefüges, die biologischen und chemischen Eigenschaften des Bodens, die Wurzelverteilung, die Verunkrautung, die Ertragsbildung der Feldfrüchte und die Qualität der pflanzlichen Erzeugnisse sowie das Strohmanagement und den Abbau der Erntereste.


12.2 Methodische Vorgehensweisen

Die Versuchsflächen werden seit 1970 mit differenzierter Bodenbearbeitung ("*Lockerbodenwirtschaft*", "*Festbodenmulchwirtschaft*") behandelt. Die Fruchtfolge in den letzten Jahren: 2002 Winterweizen, 2003 Winterweizen, 2004 Körnererbse, 2005 Winterweizen, 2006 Mais, 2007 Ackerbohnen, 2008 Winterweizen, 2009 Sommergerste („Marthe“), 2010 Winterroggen („Visello“), 2011 Hafer („Scorpion“), 2012 Triticale („Somtri“), 2013 Winterraps („Visby“) mit nachfolgender Zwischenfrucht (Ramtillkraut), 2014: 50 % der Versuchsfläche Ackerbohnen („Fuego“) und Hafer („Contender“), 50 % der Versuchsfläche Triticale („Somtri“), nachfolgende Zwischenfrucht: Gemenge aus Buchweizen, Sonnenblumen, Phacelia und Alexandriner-Klee, 2015: 50 % der Versuchsfläche Ackerbohnen („Fuego“) und Hafer („Contender“), 50 % der Versuchsfläche Ackerbohnen („Fuego“), 2016: Winterweizen („Matrix“).

Vergleich der Ergebnisse mit dem ähnlichen Dauerversuch „Hohes Feld“.

12.3 Kooperation

Der Schlag Garte-Süd ist seit Anfang 2007 Teil der Untersuchungsflächen im Rahmen des DFG-Graduiertenkollegs 1397 „Steuerung von Humus- und Nährstoffhaushalt in der ökologischen Landwirtschaft“ der Universitäten Kassel und Göttingen.



Feldplan Bodenbearbeitungsversuch "Garte-Süd"



13 Fachgruppe Genetische Ressourcen und ökologische Züchtung

Dr. B. Horneburg, Prof. Dr. H. C. Becker, B. Wedemeyer-Kremer, M. Ruland, , A Pregitzer, C. Erika
Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abteilung Pflanzenzüchtung

Tomaten (*Lycopersicon spec.*)

Tomaten sind seit dem Beginn ihrer Verbreitung in Deutschland am Anfang des letzten Jahrhunderts eines der beliebtesten Gemüse geworden. Global sind Tomaten das Gemüse Nr. 1. Im Inland werden im Erwerbsanbau nicht einmal 10% des Bedarfs erzeugt, obwohl sie in (fast) jeder Gärtnerei – zunehmend als Qualitätstomaten – angebaut werden. Viele Gärtnereien vermarkten in den Monaten April bis Juni Jungpflanzen.

Das ökologische Freiland-Tomatenprojekt

Ein wesentlicher begrenzender Faktor für die Ausweitung der Tomatenproduktion sind die Schwierigkeiten im Freilandanbau. Der Freilandanbau ist Ressourcen schonend und kostengünstig, da Glas- oder Folienkonstruktionen und teilweise auch Bewässerung nicht nötig sind. Die Produktion wird jedoch durch die Kraut- und Braunfäule (*Phytophthora infestans*) sehr stark eingeschränkt: Die Erregerassen befinden sich im Wandel und seit den 1980er Jahren nimmt die Virulenz zu.

- Die Eigenschaften von 25 Zuchtlinien von Cocktail- und Salattomaten aus dem Freiland-Tomatenprojekt werden gegen Standardsorten und diverse Genotypen auf Feldresistenz gegen *P. infestans*, Frühzeitigkeit, Qualität und Ertrag geprüft. Weitere Versuchsorte sind das ökologische Versuchsgut Kleinhohenheim der Universität Hohenheim, eine Fläche von Culinaris in Ballenhausen, der Versuchsbetrieb Ökologischer Gemüsebau der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Bamberg und die Lohmann's Hof Gärtnerei bei Verden.
- Eine Gruppe ausgewählter Genotypen wird gemeinsam mit Arche Noah und Bauernparadeiser in Österreich in einem Ringversuch in Österreich an 6 Orten untersucht.
- Diverse Akzessionen der in Zuchtprogrammen verwendeten Wildarten *L. pimpinellifolium*, *L. hirsutum*, *L. cheesmanii*, *L. chmielewskii*, *L. parviflorum*, *L. pennellii*; *L. peruvianum*, *L. chilense* werden frei wachsend am Zaun auf Feldresistenz gegen *P. infestans* geprüft.
- Der vereinfachte, vieltriebige Anbau im „Göttinger System“ wird demonstriert.

Qualitätsbildung bei Tomaten unter low-input Bedingungen

Gemeinsam mit der Abteilung Qualität Pflanzlicher Erzeugnisse, Prof. Elke Pawelzik

Die Qualität von 20 Tomatensorten wird im Jahreslauf anhand der Parameter Farbe, Festigkeit, Zucker- und Säuregehalt analysiert. Ausgewählte Sorten werden sensorisch untersucht. Es werden 8 Wiederholungen mit je 2 Pflanzen bei moderater Bewässerung und Düngung im Überdachten Feldanbau angebaut, einem System, dass die wichtigsten aktuellen Krankheiten (*P. infestans*, *Cladosporium fulvum*) ausschließt.

Die Sorten decken das Spektrum von historischen Sorten bis zu den jüngsten ökologischen und konventionellen Sorten für Freiland, Folientunnel, beheizten Anbau und Hydroponik ab. Alle Sorten wurden bzw. werden in Deutschland angebaut.

Folgende Fragestellungen werden bearbeitet:

- Wie groß sind genotypische Qualitätsunterschiede unter low-input Bedingungen?
- Kann die Variation züchterisch genutzt werden?
- Wie weit hängt die Qualität von der Züchtungsumwelt ab?

Linse (*Lens culinaris* Medik)

Standortspezifische Populationsentwicklung durch natürliche Selektion

Im Zusammenhang mit der Erhaltung und Nutzung von genetischen Ressourcen wird neben der Lagerung von Samen in Genbanken ('ex-situ') zunehmend die Bedeutung eines kontinuierlichen Anbaus ('on-farm') betont. Es gibt aber kaum Untersuchungen dazu, inwieweit und wodurch es dabei zu einer evolutiven Anpassung der Sorten an bestimmte Umweltbedingungen kommt. Drei Fragen werden untersucht (Lageplan siehe Leguminosen-Zuchtgarten):

- Sind durch natürliche Selektion innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums von 10 Generationen Veränderungen zu erwarten und kommt es dabei zu einer standortspezifischen Anpassung? Selektionen von 3 Höfen (Reinshof, Schönhagen, Tangsehl) von 3 Genbank-Akzessionen werden an allen 3 Orten in den Generationen 1, 5 und 10 in 5 m²-Parzellen mit 4 Wiederholungen geprüft. In den Generationen 1 und 10 wird die Diversität anhand von jeweils 50 Einzelpflanzen-Nachkommenschaften erfasst.
- Welche Rolle spielt eine unterschiedliche Wasserversorgung bei standortspezifischer Differenzierung? In mobilen rainout sheltern wird jeweils die Generation 10 mit und ohne Trockenstress in 5 m²-Parzellen mit 4 Wiederholungen geprüft.
- Welche Bedeutung hat die Samengröße für die natürliche Selektion? In 6 Generationen auf große bzw. kleine Samen selektierte Populationen werden in 5 m²-Parzellen mit 4 Wiederholungen und mit je 50 Nachkommenschaften im Vergleich mit natürlicher Auslese untersucht.
-

Anpassungsfähige Populationen

Vier genetisch diverse Populationen (aus je 20 F3-Linien bzw. 4 F8-Linien) unterliegen seit 2014 an je vier Orten in Deutschland und Kanada in 10 m²-Parzellen der natürlichen Auslese. Untersucht werden soll das Anpassungspotenzial.

In Zusammenarbeit mit der University of Saskatchewan und dem Keyserlingk-Institut.

14 Rapszuchtgarten

Dr. C. Möllers, Prof. H. Becker, M. Ghanbari, E. Heinrich, J.-C. Richter,
D. Kaufmann, G. Miotke
Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abteilung Pflanzenzüchtung

14.1 Zielsetzung

Im nordwestlichen Europa ist der Winterraps die wichtigste Öl- und Proteinpflanze, die von Landwirten in einer häufig getreidebetonten Fruchtfolge sehr geschätzt wird. Das aus dem Raps gewonnene Öl gilt als sehr wertvoll für die menschliche Ernährung und wird auch als wichtiger Rohstoff zur Erzeugung von Biodiesel verwendet. Im Anbau befinden sich überwiegend Hybridsorten. Wichtiges Zuchtziel ist die Erhöhung des Ölertrages, welches durch Züchtung auf einen hohen Kornertrag und einen hohen Ölgehalt erreicht werden kann. Für eine langfristige Steigerung des Ölertrages wird derzeit der Entwicklung von divergenten genetischen Pools für die Erzielung maximaler Hybriderträge große Aufmerksamkeit geschenkt. In diesem Zusammenhang kommt der Evaluierung und Nutzung genetischer Ressourcen (Pre-Breeding) beim Raps große Bedeutung zu. Aus ökologischen und ökonomischen Gründen ist die genetische Verbesserung der Stickstoffeffizienz beim Raps ein weiteres wichtiges Zuchtziel. Neben dem Öl ist das nach der Extraktion anfallende Rapsschrot die wichtigste einheimische Eiweißquelle für die Tierernährung. Hier gibt es züchterische Ansätze die Proteinqualität weiter zu verbessern, damit zusätzliche Einsatzmöglichkeiten nicht nur in der Tierernährung, sondern auch in der Lebensmittelproduktion entstehen können. Ein größerer Versuchsanbau mit Genbankmaterial von Leindotter (*Camelina sativa*) zur Evaluierung agronomischer Eigenschaften findet in 2016 erstmalig statt.

14.2 Fragestellungen

Die o.g. Ziele sollen erreicht werden durch:

- Erweiterung der genetischen Variation durch "Resynthesen" (= Rapsformen aus Kreuzung zwischen Rüben und Kohl)
- Verbesserung der Stickstoff-Aufnahme und –Verwertung durch Halbzwerghybriden
- Erweiterung der genetischen Variation durch Kreuzung mit chinesischem Material
- Erhöhung des Ölgehaltes durch weite Kreuzungen, markergestützte Selektion und Entwicklung von Substitutionslinien
- Evaluierung gelbsamiger Formen zur Verbesserung der Proteinqualität
- Untersuchung der genetischen Variation und Vererbung der Stängelstreckung vor Winter als wichtiges Teilmerkmal der Winterhärte
- Bestimmung des Vernalisationsbedarfs durch Feststellung der Infloreszenzbildung nach Frühjahrsaussaat.


14.3 Methodische Vorgehensweise

Auf einer Fläche von etwa 3 ha werden angebaut:

- Parzellenversuche zur Ertragsfeststellung; Parzellengröße 10,5 m², meist Anlage als Gitterversuche mit 2 Wiederholungen; dreistufige Prüfungen mit unterschiedlicher N- Düngung (ungedüngt (N₀), N₁ und optimale N-Versorgung (N₂); insgesamt etwa 455 Parzellen
- Beobachtungsanbau zum Erfassen agronomischer Merkmale Anbau in Doppelreihen; insgesamt etwa 3900 Doppelreihen; Teilweise Isolierung selektierter Pflanzen unter Tüten zur Vermeidung von Fremdbefruchtung.

N

Raps-Zuchtgarten 2015/16



15 Ackerbohnenzuchtgarten

apl. Prof. W. Link, L. Brünjes, D. Siebrecht, R. Martsch
 Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abteilung Pflanzenzüchtung
www.uni-goettingen.de/de/48273.html

Die **Ackerbohne** (Fababohne, Pferdebohne, field bean, horse bean, féverole, haba, *Vicia faba* L.) ist eine traditionelle Hülsenfrucht der Alten Welt. Sie wird weltweit in gemäßigten und semiariden Klimaten angebaut. Genutzt werden unreife & reife Samen als Nahrungsmittel & Futter. Interessant ist der Samen-Proteingehalt (30%) & die hohe Symbiose-Leistung (>100kg N/ha). Die Ackerbohne wird auch wegen ihres hohen Vorfruchtwertes angebaut. In Deutschland ist sie dennoch eine sehr wenig verbreitete Ackerfrucht; Anbaufläche **2010 & 2011 ca. 17.000ha**, **2012 & 2013 ca. 16.000ha**. Über 2014 und 2015 stieg die Fläche mittlerweile auf etwa **38.000ha**. Die mittleren Erträge im Jahr 2012 waren 39 dt/ha bei Ackerbohnen (31dt/ha bei Erbse und 18dtha bei Süßlupine). Zum Vergleich: Winterraps wurde auf 1,3 Mio. ha angebaut mit 37 dt/ha Ertrag (www.destatis.de).




Bei unseren wissenschaftlichen Experimenten zu *Vicia faba* geht es überwiegend darum, die Winterhärte und die weiteren agronomischen Eigenschaften von Winter-Ackerbohnen genetisch zu verbessern und die Nutzung von Heterosis (durch die Bestäuberinsekten vermittelt) zu optimieren. Es werden auf der Versuchsstation Reinshof unter anderem folgende Versuche angebaut:

- „**EU-Versuch Erbsen**“ Europäischer Sortenversuch mit Sommer-Erbsen
- „**Fremdbefruchtungstest**“, Test von Anbauform und Bestandesdichte auf den Fremdbefruchtungsgrad
- „**Prüfung nachwachsender Diversität**“, Sommerbohnen, Evaluierung nachwachsender genetischer Variabilität in Zusammenarbeit mit der Fa. NPZ Lembke
- „**Weizen**“, Diploider, tetraploider, hexaploider Weizen, Demonstrationsanbau für die Lehre
- „**IH**“, Erhaltung u. Verm. homozygoter Ackerbohnen (Winter + Sommertypen)
- „**Test auf Überwinterung**“, Re-Test von besten und schlechtesten Winterbohnen nach Daten aus der Klimakammer
- „**Winterbohnen-Leistungsprüfung**“, Winterbohnen, Topcross-Re-Test mit dem sog. Beobachtungsmaterial
- „**Gemengeprüfung**“, Winterbohnen mit Winterweizen, Prüfung auf Synchronität der Abreife in der Gemengesituation i.V. zur Reinsaat (s.a. IMPAC³)


Außerdem: grüne Folienhäuser ‚am Institut‘; weitere Parzellen als räumliche Isolierung im Zuchtgarten (1-8) und im Rapszuchtgarten, in der weiteren Umgebung (Rosdorf etc, ‚Polycrosse‘) und ‚am Institut‘. Am ‚Eselsweg‘ (Reinshof) wird auf einer Dauerfläche ein Dauer-Versuch in seinem vierten Jahr zur Frage der so genannten ‚**Leguminosenmüdigkeit**‘ durchgeführt.

Außerdem: die Gruppe „Ackerbohnenzüchtung“ ist am Projekt IMPAC³ beteiligt (Daniel Siebrecht; u.a. Winter-Ackerbohnen und Winter-Weizen als Gemenge; zwei separate Standortete - Reinshof, Deppoldshausen).

Leguminosen /
Linsen
Zuchtgarten
2015/16



Leguminosen
Zuchtgarten
2015/16



16 Züchtungsforschung Mais 2016

Prof. H. Becker, L. Pfalsdorf, M. Starke, U. Hill, D. Kaufmann, G. Miotke
Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abt. Pflanzenzüchtung

Energiemais: Mischkultur mit Stangenbohnen

Für die Erzeugung von Biogas ist der Anbau von Energiemais von überragender Bedeutung. Eine weitere Ausdehnung des Maisanbaus stößt aber zunehmend auf Widerstände. Ziel dieses Projektes ist es, ein Anbausystem zu entwickeln, in dem Mais in Mischkultur mit Stangenbohnen angebaut wird. Auf diese Weise soll der gleiche Biomasseertrag wie im Reinanbau von Mais erzeugt werden, aber mit positiven ökologischen Nebeneffekten (u.a. Erhöhung der Biodiversität, Förderung von Bestäuberinsekten, Reduktion der mineralischen Stickstoffdüngung). Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit der KWS SAAT AG und der Fachhochschule Nürtingen durchgeführt.

Versuche 2016

- **„Mischkultureignung“:** Prüfung von verschiedenen Kombinationen von Mais mit Stangenbohnen auf die Biomasseleistung. Anbau von 8 Maishybriden im Reinanbau in zwei Bestandesdichten (= 16 Prüfglieder) und im Gemenge mit 4 Genotypen der Stangenbohne bei zwei Aussaatzeiten der Bohne (= 64 Prüfglieder); 2 Wiederholungen: 160 zweireihige Parzellen. Die Aussaat der Bohnen erfolgt neben den Maisreihen gleichzeitig bzw. etwa 4 Wochen nach der Maissaat.
- **„Kalibrationsversuch“:** Entwicklung einer NIRS-Kalibration zur indirekten Bestimmung des Bohnenanteils und des Stickstoffgehaltes. Anbau von 10 Mais/Bohnen-Gemengen mit sehr unterschiedlichen Anteilen der beiden Arten, 2 Wiederholungen: 20 sechsreihige Parzellen.

Koppelnutzung

Die Verwendung von Pflanzen ausschließlich zur Energieerzeugung wird in der Öffentlichkeit kritisch gesehen. In diesem Projekt wird daher die Möglichkeit untersucht, die Nutzung von Mais als Futter und als Energiequelle zu kombinieren. Vorgesehen ist der Anbau von Körnermais mit gleichzeitiger Nutzung der Restpflanze als Substrat zur Biogaserzeugung. Dies erfordert einen neuen Typ von Körnermais, bei dem zur Körnerreife die Restpflanze noch einen ausreichenden Wasser- und Zuckergehalt hat um ein Silieren zu ermöglichen. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit der KWS SAAT AG durchgeführt und wird von der FNR (Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe) gefördert.

Versuche 2016

- **„Assoziationskartierung“:** Anbau von 200 Testkreuzungen, 2 Wiederholungen: 400 zweireihige Parzellen. Bestimmung von Abreifeverhalten, Chlorophyllgehalt und Zuckergehalt der Restpflanze zur Identifizierung beteiligter Gene mit Hilfe molekularer Marker.
- **„Faktorielle Kreuzungen“:** Anbau von 100 Testhybriden, 2 Wiederholungen: 200 zweireihige Parzellen. Beobachtungsanbau zur Bestätigung und Überprüfung von Ergebnissen aus dem Vorjahr.

17 Langzeitversuch zur P- und K-Düngung auf dem Reinshof

Prof. Dr. K. Dittert, Dr. B. Steingrobe, Dipl.-Ing. agr. R. Hilmer
Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abt. Pflanzenernährung und Ertragsphysiologie

17.1 Zielsetzung

Trotz einer Vielzahl von Düngungsversuchen ist die ökonomisch optimale und ökologisch verträgliche Düngungshöhe umstritten. Da der Standort beträchtlichen Einfluss auf die Nährstoffdynamik und damit die optimale Düngungshöhe hat, wurde 1983 je ein P- und ein K-Düngungsversuch von Prof. Dr. A. JUNGK auf dem Auenboden des Leinetales angelegt. Die Untersuchungen zielen darauf ab, die langfristige Dynamik der P- und K-Speicherung, -Umsetzung und -Nachlieferung bei langfristig sehr unterschiedlicher Zu- und Abfuhr über Ernteprodukte in einer Zuckerrüben-Winterweizen-Wintergerste-Fruchtfolge zu verfolgen. Dabei werden regelmäßig die Nährstoffgehalte in den Pflanzen (Pflanzenanalyse) und im Boden (LUFA-Methoden) analysiert. Im Mittelpunkt stehen die Hypothesen, dass die Nährstoffzufuhr in Höhe der Abfuhr mit den Ernteprodukten zur Erhaltung des Nährstoffgehaltes im Boden ausreicht und dass die Nährstoffmengen in den Ernterückständen bei der Düngebedarfsermittlung vollständig zu berücksichtigen sind. Zu diesem Zweck wurden neben der Düngermenge auch die Düngezeitpunkte und Düngerformen sowie die Zufuhr organischer Substanz (Ernterückstände in Form von Stroh bzw. Rübenblatt) variiert.

17.2 Fragestellung

- Welches ist die langfristig optimale Düngungshöhe bei hohem Ertragsniveau?
- Welchen Einfluss hat die Düngerform auf die Düngewirkung?
- Welchen Einfluss hat die Wahl des Düngungszeitpunktes
 - a) in der Fruchtfolge und
 - b) innerhalb des Jahres (Herbst/Frühjahr)?
- Welche Wirkungen haben überhöhte Düngergaben?
- In welchem Maße können die Nährstoffe in den Ernterückständen zur Düngung angerechnet werden?
- Welches sind die Grenzwerte im Boden und in der Pflanze für eine ausreichende Nährstoffversorgung?
- Seit 1999: Wie wirkt Klärschlamm-P im Vergleich zu Mineraldünger-P?

17.3 Methodische Vorgehensweisen

Das Grundmuster beider Versuche ist gleich. Zunächst gibt es Parzellen (12 x 12 m), in denen alle Ernteprodukte, auch Stroh und Zuckerrübenblatt, vom Feld abgefahren werden (GA). Die damit abgefahrenen P- bzw. K-Mengen werden entweder mineralisch ersetzt oder nicht ersetzt (Nullparzellen).

Daneben gibt es die Wirtschaftsweise, dass Stroh und Blatt auf dem Feld verbleiben (SBV). Es erfolgt der 0,5-, 1-, 3- oder 9-fache Ersatz der Abfuhr, oder die Düngung unterbleibt ganz (Nullparzellen). Bei der Wirtschaftsweise "SBV" gibt es weitere Varianten, in denen P bzw. K in der Fruchtfolge (alle 3 Jahre) nur zu den Zuckerrüben gedüngt wird. Bei allen diesen Varianten erfolgt die Düngung im Herbst (P als Triplephosphat, K als 60er Kalisalz).

Daneben gibt es Varianten mit der Düngung im Frühjahr. Im K-Versuch gibt es ferner eine Düngungsvariante, in der zusätzlich NaCl ausgebracht wird, im P-Versuch wird außerdem Hyperphosphat mit geprüft. Aus besonderem wissenschaftlichem Interesse gibt es auf dem P- und K-Versuch je eine Variante, in der alle Ernteprodukte auf dem Feld verbleiben (GV). Die Tabelle 1 gibt die Versuchsglieder wieder.

Department für Nutzpflanzenwissenschaften,
Abteilung Pflanzenernährung und Ertragsphysiologie

Tabelle 1: Versuchsglieder (VG) und Nährstoffgaben des P- und K-Düngungsversuchs (von 1983 bis einschl. Frühjahr 1995, Änderungen ab Ernte 1995 siehe unten)

P-Versuch				K-Versuch			
VG	Düngung		Bemerkung	VG	Düngung		Bemerkung
	(1)	(2)	(3)		(1)	(2)	(3)
1	0	0	GV	1	0	0	GV
2	0	0	SBV	2	0	0	SBV
3	0	0	GA	3	0	0	GA
4	0,5	28	SBV	4	0,5	35	SBV
5	1	57	SBV	5	1	70	SBV
6	1,5	85	SBV	6	1,5	105	SBV
7	3	170	SBV	7	3	210	SBV
8	9	510	SBV	8	9	630	SBV
9	1	170	SBV; Fruchtfdg. zu ZR	9	1	210	SBV; Fruchtfdg. zu ZR
10	1	57	SBV; Hyperphosphat	10	1	70	SBV; KCl + NaCl
						(+19)	(wie Kali grob)
11	3	170	SBV; Hyperphosphat	11	1	273	GA
12	1	90	GA	12	1,5	105	SBV; Frühjahrsdg.
13	1,5	85	SBV; Frühjahrsdg.				
14	1	57	SBV; Klärschlamm				

(1) 0,5 = 0,5-facher Entzug, 1 = 1-facher Entzug usw.

(2) kg P₂O₅/ha bzw. kg K₂O/ha, kg NaCl/ha

(3) G = Gesamtpflanze; V = Verbleib auf dem Feld; SB = Stroh und Blatt; A = wird abgefahren

Änderungen ab Herbst 1995:

P-Versuch: Einstellung der P-Düngung auf den Versuchsgliedern 7, 8 und 11.

In den Jahren 1999 (erstmalig), 2002, 2005, 2008, 2011 und 2014 Ausbringung von Klärschlamm (aus dem Klärwerk Göttingen) auf die VG 13 und 14 (1999: 288 kg P₂O₅/ha, 2002: 5t TM = 149 kg P₂O₅/ha, 2005: 5t TM = 143 kg P₂O₅/ha, 2008: 5t TM = 372 kg P₂O₅/ha, 2011: 5t TM = 476 kg P₂O₅/ha, 2014: 5t TM = 573 kg P₂O₅/ha), VG 6 erhielt als Kontrolle dazu in diesen Jahren die entsprechende Menge an Triplephosphat.

K-Versuch: Einstellung der jährlichen K-Düngung auf den VG 7, 8 und 12 sowie Einführung der Fruchtfolgedüngung auf diesen VG zu den Zuckerrüben seit Frühjahr 1997.

Die Versuche wurden in Blockanlagen mit je 4 Wiederholungen angelegt (Abb. 1). Ab Herbst 2005 wurde die Zuckerrübe durch Winterraps in der Fruchtfolge ersetzt.

Department für Nutzpflanzenwissenschaften,
Abteilung Pflanzenernährung und Ertragsphysiologie

K-Versuch

Block IV	43 10	44 3	45 11	46 5	47 4	48 8
	37 2	38 9	39 7	40 6	41 12	42 1
Block III	31 2	32 10	33 3	34 5	35 7	36 1
	25 8	26 11	27 9	28 6	29 12	30 4
Block II	19 1	20 5	21 11	22 9	23 3	24 6
	13 4	14 2	15 12	16 7	17 10	18 8
Block I	7 7	8 8	9 9	10 10	11 11	12 12
	1 6	2 5	3 4	4 3	5 2	6 1

1, 2,Parzellennummer
1, 2,.....Versuchsglied (VG)

P-Versuch

Block IV	50 4	51 11	52 14	53 3	54 10	55 2	56 6
	43 7	44 12	45 8	46 1	47 5	48 9	49 13
Block III	36 8	37 10	38 5	39 2	40 4	41 11	42 3
	29 14	30 1	31 7	32 6	33 12	34 9	35 13
Block II	22 11	23 14	24 2	25 13	26 4	27 9	28 7
	15 1	16 5	17 12	18 10	19 8	20 6	21 3
Block I	8 8	9 9	10 10	11 11	12 12	13 13	14 14
	1 7	2 6	3 5	4 4	5 3	6 2	7 1

1, 2,Parzellennummer
1, 2,.....Versuchsglied (VG)

Abb. 1: Schema der Anlage des P- und K-Versuchs

Garte

18 Einfluss von N-Düngeform und Düngemenge auf die ertragsbezogenen N₂O-Emissionen bei Winterweizen

Prof. Dr. K. Dittert, H. Wang, S. Köbke

Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abt. Pflanzenernährung und Ertragsphysiologie

18.1 Zielsetzung

Weizen benötigt für seine Kornbildung während des Wachstumsverlaufs vergleichsweise viel Stickstoff, um gute Erträge und Qualitäten liefern zu können. Durch die Stickstoffdüngung wird aber gleichzeitig auch Einfluss genommen auf Bildung klimarelevanter Spurengase im Boden. Im Hinblick auf die Emission dieser Treibhausgase spielen hierbei insbesondere die Nitrifikation und Denitrifikation mit dem Stickstoffdünger-bürtigen Lachgas (N₂O) als Teilprodukt eine wichtige Rolle.

Anhand der Bestimmung der Lachgasflüsse und N_{min}-Gehalte soll über die Vor- und Nachernteperiode untersucht werden, inwiefern die Stickstoffdüngermenge und -form auf die Lachgasemissionen Einfluss nehmen. Darüber hinaus sollen - bei Anwendung gleicher Untersuchungsverfahren - die Auswirkungen auf den Ertrag bestimmt werden.

18.2 Fragestellung

Im Rahmen dieser Versuchsanlage werden folgende Fragen bearbeitet:

- Wie verhalten sich die Lachgasflüsse bei der Anwendung verschiedener Formen von Stickstoffdüngern bei einer für die Frucht angemessenen Stickstoffversorgung?
- Wie wirken sich zusätzliche Hemmstoffe wie Urease- und Nitrifikationshemmer im Dünger auf das Pflanzenwachstum und den Ertrag aus?

18.3 Methodische Vorgehensweisen

Die Parzellen haben eine Größe von 10 m x 8 m, in denen neben dem Gas-Messbereich ein Teil jeder Parzelle für den Kerndrusch vorgesehen ist. Abgesehen von der N₀-Kontrollvariante mit 0 kg N ha⁻¹ erhält jede Düngevariante 180 kg N ha⁻¹ und wird mit 3 Wiederholungen angelegt. Verschiedene Düngerformen werden geprüft:


- Kontrolle (keine N-Düngung)
- KAS
- Entec 26
- Harnstoff
- Harnstoff + Urease-Hemmstoff

Die Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel und mechanischer Bodenbearbeitung erfolgen praxisüblich und werden in allen Varianten gleich ausgeführt.

Im Untersuchungszeitraum werden folgende Parameter untersucht: Lachgasflüsse, N_{min} im Oberboden, N_{total} der Pflanzenbiomasse, Biomassertrag und Ernteertrag.

18.4 Versuchsplan

Bezeichnung des Feldschlags: "Vor dem Hofe rechts



Variante	Düngeform	N-Menge
CK	N0-Kontrolle	0 kg N ha ⁻¹
N	KAS	180 kg N ha ⁻¹
NI	ENTEC 26	180 kg N ha ⁻¹
U	Harnstoff	180 kg N ha ⁻¹
UI	UTEC 46	180 kg N ha ⁻¹

19 Befallsverlauf, Resitzenzausprägung und Mikrosklerotienproduktion an Winter- und Sommerraps im Feld unter hohem Befallsdruck mit *Verticillium longisporum*

Prof. Dr. A. von Tiedemann, H. Reintke, E. Vorbek, A. Wilch, X. Zheng

Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Allgemeine Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz

19.1 Zielsetzung

Auf der Versuchsfläche in Weende werden Versuche mit beiden Vegetationstypen des Rapses voneinander unabhängig aber in räumlicher Nähe zueinander angelegt. Sie werden nach identischem Versuchsdesign und Beprobungsmuster untersucht. Der Versuch soll klären, wann im Feld der Befall durch den bodenbürtigen Krankheitserreger *V. longisporum* in resistenten und anfälligen Genotypen erfolgt, wie er sich daraufhin entwickelt und wie die Pflanze reagiert.

19.2 Fragestellung

- Wann dringt *V. longisporum* in die Wurzel ein? Wie gestaltet sich das Ausbreitungsmuster in der Pflanze?
- Wann wird Resistenz ausgeprägt?
- Kommt es in resistenten Genotypen zur Bildung von Mikrosklerotien auf der Stoppel?
- Ist *V. longisporum* in den Samen stark befallener Pflanzen nachweisbar?
- Wie unterscheiden sich Winter- und Sommerraps im Hinblick auf die zu untersuchenden Aspekte?

19.3 Methodische Vorgehensweise

Es werden je zwei Rapsgeotypen mit deutlich differenzierender Anfälligkeit ausgewählt:

- Winterraps
 - Falcon (anfällig) und SEM (resistent)
 - Aussaat Ende August 2015
 - 60 Pflanzen/m²
- Sommerraps
 - Visum (anfällig) und OP-DLE-7 (resistent)
 - Aussaat April 2016
 - 100 Pflanzen/m²

Die Parzellen werden vor der Aussaat mit stark mit Mikrosklerotien besetztem Rapsstroh verseucht. Für jeden Vegetationstyp gibt es je einen randomisierten Feldversuch mit vier Wiederholungen. Die Bedingungen der Bodenbearbeitung, Aussaat, Düngung und des Pflanzenschutzes entsprechen der landwirtschaftlichen Praxis. Die Vorfrucht war Weizen. Zur Ermittlung des Befallszeitpunktes und des Ausbreitungsmusters erfolgt eine periodische Entnahme von Feldpflanzen und deren Transfer ins Gewächshaus zur weiteren Beobachtung der Symptomausprägung zu folgenden Entwicklungsstadien: 10-12, 18, 30, 32-39, 51-55, 61-65 und 80. Diese Proben werden genutzt, um die DNA von *V. longisporum* zu quantifizieren, mittels Mikroskopie den Ligninnachweis durchzuführen und den Gehalt von Salizylsäure zu analysieren. Die Bonitur der Befallsstärke am Rapsstängel erfolgt mit beginnender Abreife.

20 Untersuchungen zu Fruchtfolgen mit Energiepflanzen als ein Beitrag zur Reduktion von phytomedizinischen Risiken und des Pflanzenschutzmitteleinsatzes im Ackerbau

Dr. H.-H. Steinmann¹, Dipl. Geogr. S. Stein¹, M. Sc. agr. M. N'ditsi², Prof. Dr. A. von Tiedemann²

¹ Zentrum für Biodiversität und nachhaltige Landnutzung

² Dept. Nutzpflanzenwissenschaften, Allgemeine Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz

Partner: Universität Rostock (Prof. Dr. B. Gerowitt)

Förderer: BMELV (Projekträger Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, FNR)

20.1 Problemstellung

Die großen Ackerbaukulturen in Deutschland (Getreide, Mais und Raps) werden in kurzen, phytomedizinisch problematischen Fruchtfolgen und mit einem entsprechend hohen Pflanzenschutzmitteleinsatz angebaut. Dies gilt überwiegend für den Food- wie auch für den Non-Food-Bereich. Dass der Anbau von Energiepflanzen in der ackerbaulich orientierten Landwirtschaft zunimmt, zeigt sich an Hand aller Statistiken und Prognosen. Hat der wachsende Markt für Nachwachsende Energieträger auch zu einer erfreulichen Entwicklung hinsichtlich der Perspektiven für die agrarische Pflanzenproduktion geführt, so ist die Entwicklung ihrerseits begleitet von verschiedenen Befürchtungen, die vor allem die Intensität einer spezialisierten Produktion, die auftretenden phytomedizinischen Probleme, den dadurch bedingten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und die Wirkung auf die Agrarbiobiodiversität betreffen. Unter pflanzenbaulichen und landschaftsökologischen Gesichtspunkten wäre es ungünstig, wenn Energiefruchtfolgen dauerhaft separat von traditionellen Fruchtfolgen, womöglich mit unterschiedlichen regionalen Schwerpunkten etabliert würden. Das Vorhaben widmet sich der Analyse wichtiger fruchtfolgebedingter Probleme derartiger Fruchtfolgen und soll die Chancen des Anbaus von Energiepflanzen für die Auflockerung von engen Fruchtfolgen aufzeigen.

20.2 Untersuchungsschwerpunkte

- Einfluss von Energiefruchtfolgen auf das Auftreten von Pflanzenkrankheiten
- Einfluss der Fruchtfolge auf Dichte und Zusammensetzung der Unkrautpopulation
- Einfluss der Fruchtfolge auf die Notwendigkeit des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln (Schwerpunkt Herbizide)
- Eignung der Fruchtarten für die energetische Verwendung
- Identifizierung von Fruchtfolgemustern bei norddeutschen Landwirtschaftsbetrieben

20.3 Methodische Vorgehensweise

Das Vorhaben basiert auf Daten von Praxisbetrieben aus Norddeutschland sowie auf Feldversuchen. Im Versuch werden 4 Fruchtfolgen unterschieden (Energimaisdaueranbau; Raps-Weizen; Raps-Grünroggen-Energimais-Weizen; Weizen- Raps-Weizen-Grünroggen-Energimais); jede Frucht wird in jedem Jahr angebaut. Es werden vier verschiedene Pflanzenschutzkonzepte ausgeführt, die sich am Bedarf der jeweiligen Fruchtfolgen orientieren.

Ein Versuchsstandort befindet sich auf dem Schlag „Große Lage“ der Versuchswirtschaften, ein weiterer in Rostock. Der Versuch wurde 2009 eingerichtet.

Department für Nutzpflanzenwissenschaften
Allgemeine Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz

Energiepflanzenfruchtfolgen, Versuchsplan Große Lage, Göttingen Weende

Fruchtfolge und Feldfrucht in 2015 (in Klammern Vorrucht).

FF 4 F W (R a)	FF 3 SW (Mai s)	FF 1 Mai s (Mai s)	FF 3 ZM a (R a)	FF 2 F W (R a)	FF 4 SW (Mai s)	FF 2 Ra ps (F W)	FF 4 Ra ps (S W)	FF 3 Ra ps (S W)	FF 4 ZM a (F W)	FF 3 Ra ps (S W)	FF 4 SW (Mai s)	FF 4 ZM a (F W)	FF 2 F W (R a)	FF 4 Ra ps (S W)	FF 3 S W (M a)	FF 1 Mai s (Mai s)	FF 3 ZM a (R a)	FF 4 F W (R a)	FF 2 Ra ps (F W)
--	---------------------------------	--	---	--	---------------------------------	--	--	--	---	--	---------------------------------	---	--	--	--	--	---	--	--

PS-F0	UK-PS	PS-F0	UK-BK	UK-BK	PS	UK-BK	PS-F0	UK-PS	PS	UK-PS	PS	UK-BK	UK-PS	PS-F0	UK-PS	PS	PS-F0	UK-BK	PS
PS	PS-F0	PS	UK-PS	UK-PS	PS-F0	PS	UK-BK	UK-BK	UK-PS	PS-F0	UK-BK	PS	PS-F0	UK-PS	UK-BK	UK-BK	UK-PS	UK-PS	UK-PS
UK-PS	UK-BK	UK-PS	PS	PS-F0	UK-BK	UK-PS	PS	PS	PS-F0	PS	PS-F0	UK-PS	UK-BK	UK-BK	PS	PS-F0	UK-BK	PS	PS-F0
UK-BK	PS	UK-BK	PS-F0	PS	UK-PS	PS-F0	UK-PS	PS-F0	UK-BK	UK-BK	UK-PS	PS-F0	PS	PS	PS-F0	UK-PS	PS	PS-F0	UK-BK
PS	UK-PS	UK-BK	PS	PS-F0	UK-BK	PS-F0	UK-PS	PS	UK-PS	PS	PS-F0	UK-PS	PS	UK-BK	PS	PS-F0	UK-BK	PS-F0	UK-PS
UK-PS	UK-BK	PS	PS-F0	PS	UK-PS	UK-BK	PS-F0	UK-PS	UK-BK	UK-PS	UK-BK	UK-BK	PS-F0	UK-PS	UK-BK	PS	PS-F0	UK-BK	PS
UK-BK	PS-F0	PS-F0	UK-PS	UK-PS	PS	PS	UK-BK	UK-BK	PS-F0	UK-BK	PS	PS-F0	UK-PS	PS	PS-F0	UK-PS	PS	UK-PS	UK-BK
PS-F0	PS	UK-PS	UK-BK	UK-BK	PS-F0	UK-PS	PS	PS-F0	PS	PS-F0	UK-PS	PS	UK-BK	UK-PS	UK-BK	UK-BK	UK-PS	PS	PS-F0

Hier Basislinie: Straße von der Kläranlage Göttingen zum Kompostwerk. Parzellenbreite 7,5 m. Nordrichtung →

Fruchtfolgen

FF 1 Maisdaueranbau
Pflanzenschutzmitteleinsatz

Versuchsglieder

PS Situationsbezogener

Department für Nutzpflanzenwissenschaften
Allgemeine Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz

21 Einfluss der Fruchtfolge auf die Entwicklung von Pilzkrankheiten, Schädlingen und Unkräutern im Raps

Prof. Dr. A. von Tiedemann, Dr. B. Koopmann, Dr. B. Ulber

Dept. Nutzpflanzenwissenschaften, Allgemeine Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz

21.1 Zielsetzung

Der Fruchtfolge-Dauerversuch besteht seit 1988. Es werden Pflanzenschutzprobleme untersucht, die durch eine Ausweitung des Rapsanbaus entstehen. Im Mittelpunkt der Beobachtungen steht dabei das Auftreten von Pilzkrankheiten am Raps. Es werden aber auch Entwicklungen im entomologischen und herbologischen Bereich erfaßt. Aus den Ergebnissen können Empfehlungen für die Entwicklung von Rapsfruchtfolgen abgeleitet werden. Der Versuch dient insbesondere als Demonstrationsversuch in der Lehre für Studierende im Bachelorstudium Agrarwissenschaften/Pflanzenproduktion.

21.2 Fragestellungen

- Einfluss der Fruchtfolge auf das Infektionspotential von *Phoma lingam*, *Sclerotinia sclerotiorum* und *Verticillium longisporum*
- Einfluss der Fruchtfolge auf den Befallsbeginn und die Befallsstärke verschiedener Schadinsekten an Winterraps
- Einfluss der Fruchtfolge auf Dichte und Zusammensetzung der Unkrautpopulation.
- Einfluss der Fruchtfolge auf die Erträge, die Bestandesentwicklung und den Nährstoffvorrat im Boden

21.3 Methodische Vorgehensweise

Es werden vier verschiedene Fruchtfolgen mit einem Rapsanteil von 25%, 33%, 50% und 100% gegenübergestellt. (vgl. Versuchsplan) Die Bodenbearbeitung ist generell nicht-wendend. Bestandesentwicklung, N-Vorrat im Boden, Verunkrautung, Schädlings- und Krankheitsbefall und Überdauerungsstrukturen der Pathogene im Boden und auf der Bodenoberfläche sowie die Erträge werden erfasst.

Versuchsstandort: Universitäts-Nordgebiet (nördlich Otto-Hahn-Strasse):

Süd

Nord

Weendelsbreite II 2015/2016

Fruchtfolgeversuch

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Var.1	Var.2	Var.3	Var.4	Var.2	Var.3	Var.1	Var.4	Var.2	Var.4	Var.1	Var.3

13 WG	13 WG	13 WW	13 WR	13 WG	13 WW	13 WG	13 WR	13 WG	13 WR	13 WG	13 WW
14 WR	14 WR	14 WR	14 WR	14 WR	14 WR	14 WR	14 WR	14 WR	14 WR	14 WR	14 WR
15 WW	15 WW	15 WW	15 WR	15 WW	15 WW	15 WW	15 WR	15 WW	15 WR	15 WW	15 WW
16 Hafer	16 WG	16 WR	16 WR	16 WG	16 WR	16 Hafer	16 WR	16 WG	16 WR	16 Hafer	16 WR

Var.1 Raps 4-jährig
Var.2 Raps 3-jährig
Var.3 Raps 2-jährig
Var.4 Raps 1-jährig

Aussaat: W-Raps: 27.08.2015 **Sorte:** " Visby " 60 Körner / m²
Aussaat: W-Gerste: 28.09.2015 **Sorte:** "Souleyka" 300 Körner / m²
Aussaat: Hafer: 17.03.2016 **Sorte:** "Max" 300 Körner / m²

22 Resistenzbewertung von Rapsorten gegen Erreger der Wurzelhals- und Stängelfäule *Phoma lingam*

E. Vorbeck, H. Reintke, M. Winter, B. Koopmann

Dept. Nutzpflanzenwissenschaften, Allgemeine Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz

22.1 Zielsetzung

Im Rahmen von Feldversuchen werden verschiedene Winterrapsorten vergleichend auf ihre Phoma-Resistenz untersucht und bewertet. Hierbei werden im Parzellenanbau Sorten mit verschiedenen monogenen Resistenzen getestet. Die Testung der Sorten erfolgt unter natürlichen Befallsbedingungen sowie unter erhöhtem Befallsdruck, der durch das Ausbringen phomainfizierter Rapsstoppel erzeugt wird. Die Anfälligkeiten der Sorten sowie Ertragseffekte (Korn- und Ölertrag) sollen im Vergleich zu einer Phoma-Gesundvariante ermittelt werden.

22.2 Fragestellungen

- Einfluss des Stoppel-Inokulums auf den Befall
- Effektivität der verschiedenen Phoma-Resistenzen im Vegetationsverlauf
- Auftreten von resistenzbrechenden Phoma-Isolaten
- Infektionseffekte hinsichtlich Korn- und Ölertrag

22.3 Methodische Vorgehensweise

Acht Rapsgenotypen (NK-Bravour [6], Exocet (Rlm7), Caiman (Rlm7), Berliozz (LepR3), Cobra, Elektra [6], Rapsstamm SY1 und Shepra [5]) mit z.T. unterschiedlicher Phoma-Einstufung des Bundessortenamtes (in eckiger Klammer, Referenz: Beschreibende Sortenliste 2011) und Ausstattung mit monogenen Phoma-Resistenzen (in runder Klammer) werden angebaut. Der Befallsdruck soll mit der Ausbringung von Stoppelresten erhöht werden. Diese Variante wird mit unbehandelten Parzellen verglichen, die der Erfassung des natürlichen Befallsdruckes dienen. Weiterhin wird eine Gesundvariante geführt, die eine regelmäßige Fungizidbehandlung mit einem Azol -Fungizid (ERIA, ca. alle 3 Wochen) erfährt. Das Fungizid wurde dahingehend ausgewählt, dass keine ertragsrelevanten physiologischen Nebenwirkungen zu berücksichtigen sind.

Der Versuch wird über die Vegetationsperiode beprobt, um die Krankheitsdynamik zu erfassen. Die Pflanzenentnahme erfolgt aus Probenahmeparzellen. Parallel dazu wurden Ernteparzellen für Ertragserhebungen angelegt. Der Versuch umfasst 24 Versuchsglieder (8 Sorten * 3 Behandlungen), die in vierfacher Wiederholung angelegt wurden. Die Parzellengröße (Summe aus Beprobungs- und Beerntungsparzelle) umfasst 2,5m*9,8 m = 24 qm, die reine Versuchsfläche beträgt somit 576 qm.

Department für Nutzpflanzenwissenschaften
Allgemeine Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz

Versuchsanlage:

Parzelle		A		B		C		D		E		F		G		H	
		(E)	(P)														
12	FG	3		17		14		15		1		11		7		9	
11		10		22		13		3		5		18		8		12	
10		19		7		2		20		14		24		18		13	
9		12		11		9		18		19		8		4		17	
8		15		21		6		23		20		9		24		5	
7		5		24		17		16		7		15		22		19	
6		23		13		24		10		3		2		11		20	
5		8		6		11		12		16		21		1		10	
4		20		9		22		1		23		4		2		16	
3		16		4		21		19		10		12		15		3	
2		18		14		7		8		13		6		21		23	
1	FG	1		2		4		5		17		22		6		14	
		(E)	(P)														

Legende:

Variant	Sorte	Behandlung	Variant	Sorte	Behandlung
1	NK-Bravour	Kontroll	13	Cobra	ERIA
2	Exocet	Kontroll	14	Elektra	ERIA
3	Caiman	Kontroll	15	Stamm SY1	ERIA
4	Berliozz	Kontroll	16	Sherpa	ERIA
5	Cobra	Kontroll	17	NK-Bravour	Stoppe
6	Elektra	Kontroll	18	Exocet	Stoppe
7	Stamm SY1	Kontroll	19	Caiman	Stoppe
8	Sherpa	Kontroll	20	Berliozz	Stoppe
9	NK-Bravour	ERIA	21	Cobra	Stoppe
10	Exocet	ERIA	22	Elektra	Stoppe
11	Caiman	ERIA	23	Stamm SY1	Stoppe
12	Berliozz	ERIA	24	Sherpa	Stoppe

- A11 Parzellenbezeichnung -zusammengesetzt aus Spalten- (A-H) und Zeilenbezeichnung (1-12)
- 1-24 Versuchsvarianten
- FG Fahrgasse
- (E) Subparzelle für die Beerntung
- (P) Subparzelle für die Probenahme

23 Resistenzbewertung von Hafersorten gegen die Rispenfusariose (*Fusarium spp.*)

P. Georgieva, V. Pollzien, Prof. A. Tiedemann und M. Winter

Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Allgemeine Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz

23.1 Zielsetzung


Die Rispenfusariose gehört mittlerweile zu den wichtigsten Pilzkrankheiten im Haferanbau. Sie wird durch Vertreter aus der Gattung *Fusarium* ausgelöst. Neben Ertragsreduktionen kommt es zu Mykotoxinkontaminationen des Ernteguts durch die Fusariumpilze (z.B. Deoxynivalenol, DON), welche die Gesundheit von Mensch und Tier beeinträchtigen können. Sortenresistenzen sind dabei das effizienteste Mittel zur Kontrolle der Krankheit. Daher soll ein Set von 25 verschiedenen Hafergenotypen hinsichtlich der Resistenz gegenüber *Fusarium* nach künstlicher Inokulation überprüft werden. Durch den Einsatz verschiedener Inokulumvarianten soll die Frage geklärt werden, ob eine Mischinokulation zu den gleichen Ergebnissen führt wie eine einzelne Inokulation mit den jeweiligen Mischungspartnern. Das soll weiterhin aufzeigen, ob es zu einer Konkurrenz zwischen den Pilzen *F. sporotrichioides* und *F. culmorum* bei gemeinsamer Inokulation kommt. Zusätzlich soll im Rahmen dieses Versuches ein effektives Bewertungsverfahren für die Resistenz von Hafer nach *Fusarium*-infektion der Rispe etabliert werden.

23.2 Inhalte

- Bewertung des Resistenzniveaus von 25 Hafergenotypen nach künstlicher Inokulation mit verschiedenen Chemotypen von *Fusarium*
- Mykotoxinnachweise in verschiedenen Ährchen- und Kornkompartimenten sollen aufzeigen, welche Bereiche nach einer Rispeninfektion am meisten mit Mykotoxinen belastet sind

23.3 Methodische Vorgehensweise

Die Versuche werden als vollständig randomisierte Blockanlage mit 25 Genotypen in dreifacher Wiederholung angelegt. Im Jahr 2016 umfasst die Versuchsserie 3 Standorte in Deutschland. Ein Versuchsstandort liegt auf der Fläche Große Breite in Göttingen. Der Versuch wird während der Blüte mit den verschiedenen Mykotoxinproduzenten *Fusarium langsethiae*, *F. sporotrichioides* und *F. culmorum*, sowie mit einer Mischung aus *F. sporotrichioides* und *F. culmorum* inokuliert. Zur Quantifizierung der Befallsstärke des Erregers werden visuelle Feldbonituren durchgeführt. Durch die künstliche Inokulation hervorgerufene Mykotoxin- und Pilzbelastung wird im Erntegut untersucht. Zusätzlich werden die Witterungsparameter Niederschlag, relative Luftfeuchte und Tagesdurchschnittstemperaturen bis zur Haferernte dokumentiert, ihren Einfluss auf die Infektion und Befallsstärke mit den einzelnen Erregern ermitteln zu können.



24 Studentisches Praktikum zum Randeffect auf Pflanzen, Tiere und ökologische Prozesse in an Wald grenzende ökologisch und konventionell bewirtschaftete Weizenfelder

H. Schlinkert, Prof. T. Tschardtke,
Department für Nutzpflanzenwissenschaft, Abteilung Agrarökologie

24.1 Zielsetzung und Fragestellung

Als eine der Hauptursachen für den Rückgang der Artenvielfalt gilt die Intensivierung der Landwirtschaft. Die intensive Bewirtschaftungsweise mit Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und der Verlust von permanenten Randstrukturen durch die Vergrößerung von Feldern führen oft zu einer arten- und individuenärmeren Flora und Fauna der landwirtschaftlich genutzten Flächen. Dabei spielen insbesondere viele Wirbellosenarten in ihrer Funktion als natürliche Gegenspieler von Schadinsekten oder als Bestäuber von Nutzpflanzen eine bedeutende Rolle für eine nachhaltige Landwirtschaft.

Im Rahmen des studentischen Praktikums „Agrarökologie und Biodiversität“ führen Studenten in Kleingruppen Versuche durch, mit denen sie den Einfluss von Wald auf die Biodiversität von Pflanzen, Tieren und ökologische Prozesse in angrenzenden Weizenfeldern untersuchen. Es soll festgestellt werden, ob Wald als permanente Struktur als Besiedlungsquelle von Schädlingen und Nützlingen dient und wie weit diese Randeffecte in die Felder hineinreichen. Dabei werden ökologisch und konventionell bewirtschaftete Weizenfelder miteinander verglichen, um einerseits den Einfluss der Bewirtschaftungsweise auf den Randeffect zu untersuchen, und andererseits um Unterschiede zwischen ökologisch und konventionell bewirtschafteten Weizenfeldern hinsichtlich der Biodiversität von Pflanzen und Tieren, sowie hinsichtlich ökologischer Prozesse zu veranschaulichen

24.2 Methodisches Vorgehen

Auf dem Versuchsgut Deppoldshausen werden Anfang Juli ökologisch und konventionell bewirtschaftete Weizenfelder jeweils am Feldrand und im Feldinneren mit unterschiedlichem Abstand zum Rand beprobt. Mit Hilfe verschiedener Methoden (Bodenfallen, Lebendmausefallen, Kescherfänge, Gelbschalen, Vegetations-, Spinnennetz-, Schädlings- und Nützlingsaufnahmen, Fraßdruckexperimente) werden Diversität von Pflanzen und Tieren sowie ökologische Prozesse am Rand und im Inneren der Weizenfelder erfasst. Es soll dadurch herausgefunden werden, welchen Effect angrenzender Wald auf die unterschiedlichen Organismengruppen im Weizenfeld hat und wie weit der organismenspezifische Randeffect jeweils in das Weizenfeld hineinreicht. Ob diese Effecte von der Bewirtschaftungsweise des Weizenfelds abhängig sind, wird ein Vergleich der Randeffecte in ökologisch und konventionell bewirtschafteten Feldern zeigen. Zusätzlich wird der Unterschied zwischen ökologisch und konventionell bewirtschafteten Feldern bzgl. ihrer assoziierten Flora, Fauna und ökologischen Prozesse veranschaulicht werden.

Unabhängig von der Fragestellung vollziehen die Studenten dabei durch die relativ eigenständige Versuchsdurchführung den Prozess einer wissenschaftlichen Untersuchung nach. Sie lernen verschiedene Organismengruppen und deren Funktionen in der Agrarlandschaft kennen und erhalten Einblicke in unterschiedliche Methoden, diese zu untersuchen. In gemeinsamen Präsentationen und Diskussionen werden die Ergebnisse zusammengeführt

25 Versuchs- und Demonstrationsfläche Agroforst

Prof. Dr. J. Isselstein¹, Prof. Dr. N. Lamersdorf², PD Dr. M. Potthoff³

¹Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abteilung Graslandwissenschaften; ²Büsgen-Institut, Abteilung Ökopedologie der gemäßigten Zonen, ³Zentrum für Biodiversität und nachhaltige Landnutzung, Sektion Landwirtschaft und Umwelt

25.1 Zielsetzung und Fragestellung

Als gemeinsames Lern- und Versuchsprojekt haben die Fakultäten für Agrar- und Forstwissenschaften 2011 ein modernes sogenanntes „Alley-cropping“-Agroforstsystem auf dem Schlag „Tannenbergl“ etabliert. Es sollen Wechselwirkungen zwischen den Ackerfrüchten und den streifig angelegten Baumreihen untersucht werden. Langfristig werden in studentischen Projekt-, Bachelor- und auch Masterarbeiten eine Vielzahl unterschiedlicher Fragestellungen von der Agrarökologie bis in die Ökonomie bearbeitet werden können. Die Fläche dient dem Modul „Agroforst“ im BSc.-Studiengang „Ökosystemmanagement“ als Arbeitsgrundlage (WS, 5. Fachsemester). Agroforstsysteme werden als tragfähige Optionen landwirtschaftlicher Flächennutzung diskutiert und ihr Flächenanteil steigt stetig. Mit der Einrichtung dieser Versuchs- und Demonstrationsanlage werden die Fakultäten dieser Entwicklung gerecht und zielgerichtetes experimentelles Arbeiten ermöglicht.

25.2 Versuchsaufbau und methodisches Vorgehen

Auf dem Schlag werden neben der normalen Ackerkultur vier Baumreihen etabliert (Abb. 1). Die Ackerstreifen sind 24m breit. Die Baumreihen, bestehend aus Pappeln und Weiden, werden als Doppelreihen angelegt und wie Kurzumtriebsplantagen zur Energieholzproduktion bewirtschaftet. D.h. die Bäume werden alle 3-9 Jahre auf den Stock gesetzt und treiben dann erneut aus. Im März 2011 wurden am Oberhang in allen Reihen jeweils Pappelruten gepflanzt. Am Mittel- und Unterhang wurden Stecklinge (Weide und Pappel) gesetzt (Abb. 2). Die Baumreihen haben eine Breite von 6,75 m und unterschiedliche Längen gemäß dem Schlagzuschnitt. Die Bäume werden in folgenden Abständen gepflanzt:

Weide: 3 Doppelreihen mit einem Pflanzverband von 75 x 75 cm innerhalb einer Doppelreihe und 150 cm Abstand zwischen den Doppelreihen und jeweils 75 cm Abstand nach außen / zum Acker (i.e. $3 \times 75 + 2 \times 150 + 2 \times 75 = 657$ cm)

Pappel: 3 Doppelreihen mit einem Pflanzverband von 75 x 100 cm innerhalb einer Doppelreihe und 150 cm Abstand zwischen den Doppelreihen und jeweils 75 cm Abstand nach außen / zum Acker (i.e. $3 \times 75 + 2 \times 150 + 2 \times 75 = 657$ cm)

Pappelruten: 3 Reihen mit einem Pflanzverband von 150 x 50 cm und jeweils 188 cm Abstand nach außen / zum Acker (i.e. $2 \times 150 + 2 \times 188 = 656$ cm)




Abb1: Schlag Tannenbergl, Lage der Baumreihen.




Abbildung 2: Pflanzschema der Baumreihen.

26 Wirkung des Befallszeitraums auf Entwicklung und Schadwirkung des Rapserrfloh (OPsylliodes chrysocephala L.)

Dr. B. Ulber, M.Sc. N. Conrad

Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abteilung Agrarentomologie und
Julius-Kühn-Institut, Institut für Pflanzenschutz im Ackerbau

26.1 Zielsetzung:

Dem ungenügenden Informationstand zur Schadwirkung, Bekämpfung und Pyrethroid-Resistenz des Rapserrfloh wird in der Praxis nach Verbot der Insektizid-Beizung mit einem Mehreinsatz von Insektizid-Flächenspritzungen bzw. sogar mit Aufgabe des Rapsanbaus begegnet. Der mehrfache Einsatz von Pyrethroiden stellt jedoch keine nachhaltige Lösung dar, da gegen diese Wirkstoffe in den wichtigen Rapsanbaugebieten bereits weit verbreitet resistente Erdflhopopulationen auftreten.

26.2 Fragestellung:

In dem Versuch sollen Erkenntnisse darüber gewonnen werden, bei welchem Befallsbeginn und unter welchen Wachstumsbedingungen ein Rapserrflohbefall zu signifikanten Schäden an den Rapspflanzen führen kann und zu welchen Terminen Bekämpfungsmaßnahmen erforderlich sind. Daraus sollen Empfehlungen für zielgerichtetere Insektizidspritzungen abgeleitet werden, die die Anzahl der Insektizidanwendungen auf das notwendige Maß zu beschränken.

26.3 Methodische Vorgehensweise:

Um die Schadwirkung der Rapserrflohlarven bei unterschiedlichem Befallsbeginn, verschiedenen Larven-Befallsstärken und innerpflanzlichen Verteilungsmustern zu erfassen, werden Rapsparzellen im Herbst unter Gazezelten isoliert und in unterschiedlichen Zeiträumen dem natürlichen Befall ausgesetzt (randomisierte Blockanlage mit 8 Wiederholungen): 1. ohne Abdeckung; 2. ab 21. September; 3. ab 05. Oktober; bis 05. Oktober. Auf diese Weise sollen Erkenntnisse zum Einfluss des Beginns der Eiablage und des Auftretens von Larven auf die folgenden Pflanzenschäden im Raps (Auswinterung, Ertragswirkung) gewonnen werden.

Zuflug und Aktivität der adulten Rapserrflöhe werden im Herbst mit Gelbschalen kontrolliert. Befallsstärke, Alter und Verteilung der Larven in den Rapspflanzen werden vom Herbst bis zum Frühjahr mehrfach bestimmt. Die Erfassung der Käfer in Gelbschalen und die Auszählung der Larven im Bestand sollen auch zu einem besseren Verständnis des Zusammenhangs zwischen den Gelbschalenfängen und dem zu erwartenden Schaden und zur Überprüfung des Bekämpfungsrichtwertes beitragen.

Aufgang und Entwicklung der Rapspflanzen in den fünf Prüfvarianten werden kontinuierlich ermittelt. Anfang November, Mitte Dezember und im Januar/Februar werden je 20 Pflanzen entnommen und auf verschiedene Wachstumsparameter (Wurzelhalsdurchmesser, Sprosslänge, Trockengewicht, u.a.) untersucht. Die Pflanzenteile (Blattstiel, Spross, Endknospe), in denen die Larven bzw. Fraßgänge gefunden werden, werden genauer charakterisiert. Eine weitere Bonitur und Bestandeszählung erfolgt je nach Jahreswitterung im Februar/März nach Vegetationsbeginn.

27 Wertprüfung der Rhizoctoniaresistenz von Zuckerrüben

P. Götze
 Institut für Zuckerrübenforschung, Göttingen

27.1 Zielsetzung

Der Erreger der Späten Rübenfäule (*Rhizoctonia solani*) hat eine hohe Bedeutung in einigen Zuckerrübenanbaugebieten. So wurden (teil-)resistente Sorten gezüchtet, die im Vergleich zu einer anfälligen Sorte unter Befallsbedingungen deutliche Ertragsvorteile haben.

Die Erfassung der Resistenz gegenüber *Rhizoctonia solani* erfolgt dabei in der Wertprüfung durch das Bundessortenamt nur über die Bonitur des Befalls und die Zählung der abgestorbenen Pflanzen. Der Ertrag wird nicht erfasst.

27.2 Fragestellungen

Abschätzung des Resistenzniveaus von Sorten unter künstlichem Befall mit *Rhizoctonia solani* im Vergleich zu zwei anfälligen Sorten.

27.3 Methodische Vorgehensweise

Die Versuche werden als vollständig randomisierte Blockanlagen mit 18 Sorten in vierfacher Wiederholung angelegt. Im Jahr 2016 umfasst die Versuchsserie 7 Orte. Ein Versuchsstandort liegt auf der Fläche „Achten“ in Göttingen. Der Versuch wird mit 100 kg/ha Gerste inokuliert.

Versuchsanlage : Lateinisches Rechteck in 4 Wiederholungen
 Parzellenummer:1601 - 1672

Randomisationsplan :

	2	5	15	18	8	9	4	13	6	12	10	7	17	1	14	16	11	3	
IV	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	IV
	11	10	6	4	3	14	7	12	18	1	8	16	15	17	5	13	2	9	
III	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	III
	1	16	9	8	14	5	11	15	17	13	6	18	3	2	12	10	7	4	
II	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	II
	17	3	12	13	7	2	16	1	10	4	14	11	5	9	15	18	8	6	
I	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	I
[Wdh]																			[Wdh]

29 Reaktion von Bodenorganismen auf Mischfruchtanbau und Feedbacks zu Pflanzen

Prof. Dr. S. Scheu, Tierökologie, J.F.-Blumenbach-Institut für Zoologie und Anthropology

Bodenorganismen einschließlich Mikroflora und Fauna, bilden einen wesentlichen Bestandteil der Biodiversität in Agrarökosystemen. Insbesondere in der Rhizosphäre von Pflanzen reagieren sie empfindlich auf die Identität und Vielfalt der Pflanzen. Dabei modifizieren Pflanzen sowohl die Struktur als auch die Funktionsweise der Bodengemeinschaften mit potenziell wichtigen Rückkoppelungseffekten für die Leistungsfähigkeit, Biomasseproduktion und den Ernteertrag der Pflanzen. Bodenorganismen in der Rhizosphäre verändern dabei nicht nur das Pflanzenwachstum, sondern auch die Anfälligkeit der Pflanzen für Krankheitserreger und Pflanzenfresser.

Im Rahmen des IMPAC³-Projektes untersuchen wir die Reaktion von Bodenorganismen auf Unterschiede in der Pflanzenzusammensetzung, sowohl in Hinsicht auf unterschiedliche Genotypen, Mischungen verschiedener Genotypen als auch Mischungen mit anderen Pflanzenarten von Acker- und Graslandsystemen. Zudem analysieren wir die Reaktion verschiedener Pflanzen-Genotypen und Genotyp-Mischungen mit anderen Pflanzenspezies auf die Zusammensetzung der Bodentiergemeinschaft. Die Reaktion von Mikroorganismen im Boden wird über substrat-induzierte Atmung und Phospholipid-Fettsäure-Analyse untersucht und die der Bodentiergemeinschaften über quantitative Erfassung mittels Hitzeextraktion. Bestimmte Mikroorganismen und Bodentiere, die signifikant auf Veränderungen der Pflanzen-Genotypen und Mischungen von Pflanzen-Genotypen mit anderen Pflanzenarten reagieren, werden zur Untersuchung von Rückkoppelungseffekten auf die Leistungsfähigkeit der Pflanzen in Laborexperimenten weiter analysiert.

Tag der Agrarwissenschaften

Freitag, 10. Juni

Versuchsgut Relliehausen

Programm

10:00 Uhr **Begrüßung**
Prof. N. Lossau, Vizepräsident Universität Göttingen
Prof. E. Pawelzik, Dekanin Agrarfakultät Göttingen
Prof. J. Langholz, em. wiss. Leiter des Versuchsgutes
Dr. D. Augustin, Leiter der Versuchswirtschaften

10:30 Uhr **Podiumsdiskussion:**
Zukünftige Schweinehaltung
in Deutschland
Dr. Dieckmann, Abteilungsleiter LWK
T. Dosch, Abteilungsleiter NMELV
H. Dirkes, Vorsitzender ISN
Prof. A. Spiller, Univ. Göttingen
Prof. E. Hessel, Univ. Göttingen

13:00 Uhr **Pause / Essen**

jeweils	1. Dauergrünlandversuche	<i>Prof. J. Isselstein</i>
14:00 Uhr	2. Schweineaufzucht und -mast	<i>C. Mascher-Twietmeyer,</i> <i>S. Meyer-Hamme</i>
14:30 Uhr	3. Göttinger Minipig	<i>C. Reimer</i>
15:00 Uhr	4. Biogasanlage	<i>H. Schwerdtfeger</i>
	5. Betrieb	<i>A. Oppermann</i>
	6. Forellenzuchtanlage	<i>H. Hartmann, C. Lodder</i>
	7. Lamahaltung und -forschung	<i>Dr. A. Riek</i>
	8. Rinderhaltung	<i>K. Salzmann</i>

FÜHRUNGEN

VORTRÄGE	15:00 Uhr	1. Hat die Bestandsgröße von konventionellen Schweinemastbetrieben Einfluss auf das Tierwohl?	<i>S. Meyer-Hamme</i>
		2. Sequenzbasierte Analyse der Körpergröße im Vergleich von Mini- und Großschweinen	<i>C. Reimer</i>
		3. Emotionen von Schweinen	<i>Prof. M. Gerken</i>
		4. Tierwohl bei der Schlachtung?	<i>E. Tönges</i>
		5. Interleukin Sex bei Kälbern	<i>Prof. S. Neumann</i>
		6. Geschlechtsbeeinflussung durch Wassertemperaturen bei der Forelle	<i>M. Westerholt</i>

zusätzliche Poster
und Darstellungen in
der Maschinenhalle
und der Werkstatt!

ab 17 Uhr **Grillen und Diskussion**



Versuchsgut Relliehausen
 Waldstraße 5
 37586 Relliehausen
dirk.augustin@zvw.uni-goettingen.de
 Tel.: 05 51/39 42 09
 bzw. 05 51/39 41 80

Busse für ca. 200 Personen fahren am
 9:00 Uhr am Waldweg in Göttingen ab.
 Eine Rückfahrt ist ab 18:00 Uhr möglich.

Tag der offenen Tür

Samstag, 11. Juni

Versuchsgut Relliehausen



- **Imbiss, Kaffee und Kuchen, Fischbrötchen**
- **Oldtimerausstellung**
Traktoren, landwirtschaftliche Maschinen und Geräte
- **Ausstellungs- und Verkaufsstände, Kunsthandwerk**
- **Schafe, Schauscheren**
- **Kinderprogramm**
(Kinderbetreuung, Strohhurg, Schminken, Reiten, u. v. m.)
- **Führungen**
- **Vorträge**



Versuchsgut Relliehausen
Waldstraße 5
37586 Relliehausen
aopperm@gwdg.de
Tel.: 0 55 64/22 17

Am Freitag, den 10. Juni findet zusätzlich der Tag der Agrarwissenschaften mit einem gesonderten Programm statt.

Samstag, 11. Juni, Versuchsgut Relliehausen

Programm

- ganztägig
- Imbiss, Kaffee und Kuchen, Fischbrötchen mit geräucherter Forelle vom Versuchsgut
 - Oldtimerausstellung, Traktoren und landwirtschaftliche Maschinen und Geräte
 - Verschiedene Ausstellungs- und Verkaufsstände, Kunsthandwerk
 - Schafe, Schafschur/Schauscheren (11 Uhr, 13 Uhr, 15 Uhr)
 - Kinderprogramm mit Kinderbetreuung, Strohburg, Schminken, Ponyreiten, Bogenschießen, Rollen & Räder u. v. m.)

FÜHRUNGEN zu den Themen:

Dauergrünlandversuche, Schweineaufzucht u. -mast, Göttinger Minipig, Biogasanlage, Betriebsführung, Forellenzuchtanlage, Lamahaltung und -forschung, Rinderhaltung

VORTRÄGE ALLGEMEIN

- 11:00 Uhr Haltungssysteme in der Nutztierhaltung aus Sicht der Verbraucher und Landwirte, *S. Kühl*
 Erstaunliches aus der Welt der Wiederkäuer, *Prof. J. Hummel*
 Von Relliehausen nach Peru: Forschung an Lamas, *Dr. A. Riek*

VORTRÄGE PFERDEHALTUNG

- 12:00 Uhr Lernverhalten bei Pferden – das kluge Pony Moritz, *V. Gabor*
 Gibt es Winterschlaf bei Pferden?, *Dr. L. Brinkmann*
 Besser als Ihr Ruf? – Grünlandwirtschaft mit Pferden, *A. Schmitz*
 Entwicklung eines Modells für das Tierwohlbewusstsein und -verhalten im Reitsport, *C. Iking*

VORTRÄGE SCHWEINEHALTUNG

- 13:30 Uhr Antibiotikaeinsatz in der Tierhaltung, *Prof. S. Neumann*
 Haben Schweine positive Emotionen?, *L. McKenna*
 Tierwohl bei der Schlachtung?, *E. Tönges*
 Die Zucht des Göttinger Miniaturschweines, *C. Reimers*

VORTRÄGE BIOGAS

- 15:00 Uhr Umweltleistungen der Biogasanlage Relliehausen, *Dr. D. Augustin*
 Biogas als Multitalent für die Energiewende, *K. Anduschus*
 Warum brauchen wir eine Energiewende?, *Dr. B. Sauer*

mit Oldtimerausstellung



Versuchsgut Relliehausen
 Waldstraße 5
 37586 Relliehausen
 aopperm@gwdg.de
 Tel.: 0 55 64/22 17

Am Freitag, den 10. Juni findet zusätzlich der Tag der Agrarwissenschaften mit einem gesonderten Programm statt.